


- 
- **Materia: Patología y técnicas quirúrgicas en pequeñas especies.**
 - **Tema: Distemper canino.**
 - **Carrera: Medicina Veterinaria y Zootecnia.**
 - **Cuatrimestre: 5to.**
 - **Alumno: Alba Paulina Gómez Alvaro.**

Distemper canino

Sinonimias

- Moquillo canino
- Fiebre catarral canina
- Enfermedad de carré

Signos clínicos

Los signos varían según la edad del animal al momento de la infección, la virulencia y el estado inmunitario del animal.

Los cachorros al ser los animales más propensos presentan:

Fiebre, conjuntivitis serosa a purulenta, tos seca, letargia, anorexia, deshidratación, fiebre, descarga oculo-nasal, tos progresiva, vómitos y diarrea.

Técnicas de diagnóstico

Por observación de los signos clínicos.

Detección del antígeno viral por medio del frotis sanguíneo.

Por inmunocromatografía

Por aislamiento viral de anticuerpos fluorescentes.

Diagnóstico diferencial

Es muy confundido a menudo con otras infecciones sistémicas como hepatitis, leptospirosis. Alteraciones nerviosas como toxoplasmosis y neosporosis, así también como casos de intoxicaciones por plomo u órganos fosforados.

Tratamiento

Administrar por vía parenteral fluidos para evitar y tratar la deshidratación. Para animales con afección en el sistema respiratorio se deben instalar en zonas cálidas y ambiente limpio.

Administrar antibióticos de amplio espectro por varias semanas y expectorantes, de ser necesario nebulizaciones para la neumonía secundaria.

Medidas preventivas

La ingestión del calostro siempre será una buena medida de prevención para cualquier animal, por otro lado la administración de vacunas en la edad temprana nos ayuda a que nuestras mascotas contraigan esta enfermedad.