



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre de alumno: Mariana Guillen

Nombre del profesor: Maria Venegas

Nombre del trabajo: Supernota

Materia: Microbiología.

Grado: 2°

Grupo: A

Comitan de Dominguez Chioas a 23 de Enero de 2020

Micosis



Las micosis son afecciones cutáneas consecuencia de la parasitación por "hongos"; estos son vegetales que no efectúan el fenómeno de la fotosíntesis.

•Tinea capitis. Afecta cuero cabelludo, cejas o pestañas. ...

La tinea capitis, tiña capitis o tiña de la cabeza es un término médico usado para una infección superficial del cuero cabelludo y del pelo causada por hongos dermatofitos de los géneros *Microsporum* y *Trichophyton*. Otras áreas como las cejas y pestañas pueden verse afectadas



TINEA BARBAE

conocida también como Tiña de la Barba, es una infección micótica superficial o también conocida como dermatofitosis.



El padecimiento se origina por el contacto de las esporas con la piel, se inicia como una tiña del cuerpo, con una pequeña zona rojiza que al crecer forma una placa eritemato-escamosa y luego se parasitan los pelos hasta la base (similar al querión de Celso). Otra forma de inicio es por traumatismos (rasurado), haciendo que las esporas entren más fácilmente y tengan una mayor probabilidad de ser reconocidas por el sistema inmune.

TINEA CORPORIS

Es una erupción cutánea causada por una infección micótica. Por lo general, es un sarpullido circular, rojo y con comezón, con la piel más clara en el medio. La tiña recibe su nombre por su apariencia. No se trata de un gusano.

Se puede propagar de las siguientes maneras:

- De humano a humano. La tiña a menudo se propaga por contacto directo de piel a piel con una persona infectada.
- De animal a humano. Puedes contraer tiña si tocas a un animal que tiene tiña. La tiña puede propagarse mientras se acaricia o cepilla a perros o gatos



TINEA CRURIS

Es una infección superficial de la piel que afecta la zona inguinal, incluyendo los genitales, región púbica y región perianal. Afecta principalmente a hombres y predomina en climas cálidos y húmedos. Es causado por hongos dermatofitos *Trichophyton rubrum* y en ocasiones por *Candida albicans*, *Trichophyton mentagrophytes* y *Epidermophyton floccosum*



TINEA PEDIS

Infección fúngica que generalmente comienza en los dedos del pie.

El pie de atleta suele presentarse en las personas cuyos pies sudan demasiado cuando usan zapatos cerrados. Los síntomas incluyen un sarpullido con descamación que suele generar comezón, escozor y ardor. Las personas con pie de atleta pueden tener piel húmeda y en carne viva entre los dedos de los pies.



TINEA MANUM



Es una dermatofitosis afecta a las plantas y palmas de las manos, es causada por especies del género *Trichophyton*. Es una enfermedad cosmopólita causada por autoinoculación en individuos con tinea pedis y puede formar parte del síndrome dos pies, una mano caracterizado por la presencia de tiña en ambos pies y una mano. Presenta un inicio vesicular-eritematoso en las palmas que al romperse dan placas eritemo-escamosas.

ONICOMICOSIS O TINEA UNGIUM



Hongo ungular que provoca uñas endurecidas, frágiles, quebradizas o irregulares. Generalmente, los problemas ocasionados por esta afección son cosméticos.

El síntoma principal son los cambios en la apariencia de las uñas. Raras veces, la afección puede causar dolor o un olor levemente desagradable.

Bibliografía: TRANSTORNOS DERMATOLÓGICOS, MEDICINA INTEGRAL.