

Nombre del alumno: Yohana Verenisse López Cruz

Nombre del profesor: Mahonrry Ruiz


Nombre del trabajo: mapas conceptúales


Materia: Enfermería del niño y el adolescente

Grado: 5to cuatrimestre

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 22 de enero de 2021.





Es un método sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta te una alteración real o potencial de la salud.


Es-

Específicamente a él

paciente y no sólo a

su enfermedad.

Se enfoca



la adolescencia temprana, de las 10 a los 13 años, la adolescencia media, desde los 14 a los 16 años, y la adolescencia tardía, de los 17 a los 19 años.

creencias y valores morales de su familia y del

son más selectivas, y las niñas son más activas que los niños desde el punto de vista social por debajo de los 12 años, y confidenciales., Ya se sabe que los amigos tienen mucho peso

Fases de la adolescencia

Conciencia moral y formación espiritual

> Relaciones sociales y amistad

arrastrarán hasta la vida adulta),

Crecimiento y desarrollo del niño y el adolescente

Desarrollo Desarrollo emocional

psicológico

fundamentalmente del mismo sexo, con un tímido

Pubertad y

adolescencia

años, la separación de la familia comienza a grupo a otras de pareja, capacidad de

En la adolescencia tardía, de los 17 a los 19

La pubertad es el período durante el cual el cuerpo adquiere las características adultas, y es una "fiesta movible" que varía de acuerdo a factores climáticos, hereditarios y ambientales.


La Adolescencia es el tiempo en que la persona crece y se desarrolla biológicamente y psicológicamente, emocional y socialmente, y esas son las tareas básicamente de la adolescencia.


> El estirón se inicia entre los 9 y 10 años (2 años antes que el del varón) y sus máximos valores entre los 12 y 13 años. El varón inicia su pubertad entre los 11 y 12 años, llegando a sobrepasar incluso a la niña en talla entre los 14 y 15 años, y esto provoca el primer problema, pues los intereses de de niño prepuber

Proceso

Termina

(menarquia). En el varón, la primera manifestación de pubertad es el aumento del tamaño de los testículos, hacia los 11 años; y de 3 cm en etapa prepuberal deberá llegar a 20 – 25 cm. en el adulto.







De orientación de la cabeza durante el primer mes de vida, estímulos sensoriales que provocan respuestas reflejas. El lactante pequeño atracción por la luz suave y rechazo por la muy viva que, actuando como agente nociceptivo, desencadena el reflejo de defensa óculopalpebral; oclusión de los párpados y rotación de cabeza en sentido opuesto al estímulo.

Cambios

El lactante del primer trimestre

Características

Se hace muy evidente en sus actitudes posturales. En decúbito dorsal, despierto y satisfecho, ofrece una gama variada de actitudes y movimientos carentes, en apariencia, de orden y finalidad.

En los miembros superiores, las manos quedan próximas a los hombros; los dedos flexionados cierran los puños, y los pulgares se oponen, por fuera, a los otros dedos

En los miembros inferiores es aún menos evidente la asimetría tónica de origen cervical.

En los momentos de reposo vigil, las rodillas, flexionadas, están muy próximas entre sí, y en plena etapa de paratonía fisiológica, los talones no contactan con el plano de apoyo.

Maduración psicomotriz.

Lactantes

Cinco meses después, al progresar la coordinación viso-motriz y adquirir habilidad un manual, puede el lactante perseguir objetos que caen a uno u otro lado de su cuerpo y llegar a asirlos: es la reacción de alineación céfalo corporal, uno de los jalones que anuncian próximo el fin de esta etapa.

Una personalidad peculiar

Tienen


El lactante del segundo trimestre

Características

se mantiene en franco decúbito dorsal, sin incursiones a los lados, salvo las no muy extensas rotaciones voluntarias de la cabeza cuando sigue con la vista algún objeto. El tronco permanece bien afirmado sobre el plano de apovo


Los cuatro miembros han perdido la rigidez de muñeco que aparentaban en el trimestre anterior, y se comportan ahora como auténticos miembros de niño, plásticos y flexibles, flexionados sin ángulos agudos, abducidos sin apreturas contra el tórax o abducidos con soltura si llega la ocasión

La persecución ocular y cefálica alcanza progresivamente los 180º en sentido transversal, a condición de que el objeto sobre el que se fija la mirada no se pierda de vista en ningún momento; en sentido vertical hacia atrás, es breve, de unos pocos grados; hacia adelante es mucho más extensa y la cabeza, flexionándose, acompaña el desplazamiento de los ojos.




Edad ósea y la altura de un niño pueden ser usadas para predecir la edad de adulto.


Edad ósea avanzada generalmente experimentan un rápido crecimiento o "estirón" pero éste se detiene pronto, mientras aquellos con una edad ósea atrasada crecen con menor velocidad.





En los varones, hay aumento de tamaño del escroto y los testículos, seguido del agrandamiento del pene, aparece vello púbico, el vello de las axilas y el vello facial aparecen alrededor de 2 años después del vello púbico. El estirón de crecimiento comienza un año después de que los testículos comiencen a aumentar de tamaño.

Las niñas, el crecimiento incipiente de las mamas es el primer signo de maduración sexual, el inicio del estirón de crecimiento, aparece vello púbico y axilar. La menstruación comienza típicamente alrededor de 2 años después del comienzo del desarrollo del pecho y cuando el crecimiento en altura disminuye después de alcanzar su velocidad máxima.









BIBLIOGRAFÍA

- UDS.2021.ANTOLOGIA DE ENFERMERIA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE.UTILIZADA EL 16 DE ENERO DEL 2021.PDF.
- ENFERMERIA DEL NIÑO Y EL ADOLECENTE.pdf