

Universidad del sureste



Mvz. Roberto García Sedano

Medicina veterinaria y zootecnia 5° cuatrimestre

Alum. Misael Enriquez Molina

Cólico equino

etiología

El dolor puede ser causado por muchas razones como hipermotilidad del intestino, distensión excesiva por gas, obstrucción de intestino con un bolo de comida endurecida, émbolos parasitarios que bloquean las arterias que llevan sangre al intestino lo que causa su necrosis o atrapamientos del intestino en hernias

signos

- Depresión.
- Inapetencia (falta de interés por comer)
- Levantar las patas delanteras.
- Mirar al flanco.
- Tumbarse más de lo habitual o en un momento distinto del normal

diagnostico

Los caballos que sufren un **cólico** pueden tener una temperatura normal (37-38 °C), fiebre (indica inflamación o infección) o hipotermia (posible estado de shock). La frecuencia respiratoria y cardíaca suelen elevarse debido a la distensión abdominal y al dolor.

tratamiento

Para ello, es necesario administrar analgésicos e instaurar una fluidoterapia a base de suero oral o intravenoso. Si el **caballo** se deja, se le puede hacer caminar lentamente **para** ayudar a estimular la motilidad intestinal, disminuir la ansiedad y paliar parcialmente el dolor.

prevención

- Dar una buena alimentación. ...
- Evitar que haya sustancias tóxicas. ...
- Debe haber calidad en los forrajes. ...
- El ejercicio del animal también es clave. ...
- La energía la debe otorgar el heno