



**UNIVERSIDAD
DEL SURESTE**

- Medicina veterinaria y zootecnia
- Jenifer Alejandra Lopez Vicente
- Barreda Roberto García
- Introduccion a la cirugia, patologia y tecnicas quirurgicas de equinos
- Colico en equino
- 5 cuatrimestre
- Tapacula Chiapas a 30 marzo 2021

COLICO

etiología

El cólico en equinos es causado por un dolor originado en estómago, intestino o el peritoneo que cubre esos órganos y la pared abdominal

signos

Signos reflejos neurovegetativos; sudoración variable, disnea, cuando los movimientos del diafragma resultan dolorosos, aumento del pulso y de la frecuencia cardíaca, depresión, la temperatura corporal generalmente no es uniforme, existiendo zonas calientes y frías, mucosas congestivas o cianóticas

Dx

Para el diagnóstico correcto es indispensable realizar un examen semiológico, y seguir un adecuado protocolo. Diferentes pruebas de diagnóstico se pueden utilizar para diagnosticar la causa del cólico equino, que puede tener mayor o menor valor en ciertas situaciones. La distinción más importante a tomar es si la condición se debe tratar médicamente o quirúrgicamente.

Tx

Este dependerá del tipo y la gravedad del cólico, si es médico o quirúrgico: principalmente se tiene que controlar el dolor con el uso adecuado de AINES, hacer uso si se requiere de tranquilizantes o sedantes, recuperar la hidratación del animal con la fluidoterapia para corregir la hipovolemia, restablecer diferencias electrolíticas y desequilibrios ácido-base y la consistencia fluida del contenido intestinal, recuperar la correcta motilidad digestiva y favorecer la evacuación intestinal por medio de emolientes como es el aceite mineral o surfactantes, y además prevenir complicaciones médicas con el uso de antibióticos.

Prevención

prevenir cólicos establezca una rutina diaria, en la que se tengan en cuenta aspectos como la alimentación y el trabajo que el animal ejerce. Verifique que el heno, la viruta, caballeriza, pastos y el entorno no tengan sustancias tóxicas, como insectos, malezas nocivas y otras materias extrañas.

Síntomas

Síntomas del dolor visceral, normalmente son evidentes, hay expresión tensa de la cara con mirada fija, labios tensos, pueden aparecer movimientos o temblores en el labio superior, rechinar de dientes, se miran a los flancos o pueden mordérselos, tocar con la pata delantera el suelo a modo de escavar, patear con las patas traseras el abdomen, tumbarse o tirarse de forma brusca al suelo, adoptar posición de micción, revolcarse o quedarse quieto en posición de decúbito, gimen, pérdida de apetito, llegan a meter la cabeza en el agua sin beberla.