

**HOJA DE PRESENTACION**

---

**NOMBRE DEL ALUMNO: JOSÉ RODRIGO PALOMEQUE DE LA CRUZ**

**NOMBRE DEL CATEDRÁTICO: MVZ. ROBERTO BARREDA GARCIA**

**NOMBRE DEL TRABAJO: CUADRO SINOPTICO**

**NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UDS. UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

## LAMINITIS

La **laminitis**, más conocida por los veterinarios equinos como infosura, se trata de una inflamación de las láminas de los cascos del caballo y cuyo resultado final puede tener graves consecuencias en la salud del animal, como por ejemplo la separación del casco de su extremidad.

### Tratamiento de la laminitis en caballos

Permitir al **caballo** estar acostado en un suelo blando con arena o viruta, ayudándolo si lo precisa.

Equilibrar la dieta según las pautas del veterinario.

Enfriar las extremidades afectadas, puesto que la temperatura de los cascos aumento considerablemente

### Tratamiento de la laminitis

Reducir **de** forma drástica la comida.

Aplicar calor.

Colocar el casco en una solución caliente **de** sulfato **de** magnesio (**que** verteremos sobre un cubo).

Vendar la zona, sin apretar.

El estudio, ha venido a enfatizar que la laminitis debe ser considerada como una importante preocupación para el bienestar del caballo durante todas las épocas del año y no sólo en primavera, “a pesar de la creencia de que la laminitis se trata de una enfermedad típica en esta estación”, señalan los expertos.

Independientemente de la época del año, los investigadores aconsejan a los propietarios de caballos “permanecer en constante vigilancia y no reducir las medidas preventivas cuando consideran erróneamente que el período de ‘alto riesgo’ de la enfermedad ha acabado” Además, el estudio ha alertado a los dueños de los equinos sobre la importancia de reconocer los signos más sutiles de los episodios de la laminitis, que pueden llegar a ser mortales para el animal Entre los signos clínicos de la enfermedad, se encuentran algunos ciertamente inespecíficos y leves, que además son los más frecuentes, como “dificultad para girar, marcha corta (conocida como marcha de alfarería), o cojera al caminar, presente en más del 70% de los casos de laminitis”, apuntan.