

Universidad del sureste



Mvz. Francisco David Vásquez Morales

Medicina veterinaria y zootecnia 5° cuatrimestre

Alum. Misael Enriquez Molina

Enfermedad del Marek

Etiología

La enfermedad de **Marek** (EM) es una enfermedad linfoproliferativa, contagiosa, causada por un herpesvirus y caracterizada por la infiltración de células en uno o más nervios periféricos, gónadas, iris, vísceras, músculo y piel.

transmisión

Se **transmite** por contacto directo e indirecto entre **aves**, por vía aerógena (polvo de plumas o descamación celular) dado que el virus es eliminado por la descamación de los folículos de las plumas. La eliminación de virus se inicia a los 14 días post infección y permanece en forma indefinida.

Signos clínicos

- Nervioso: aparece una parálisis flácida generalmente unilateral de las patas o alas. Las células tumorales infiltran el sistema nervioso periférico, especialmente el nervio ciático.
- Visceral: aparece diarrea en algunos casos. ...
- Cuello flácido: aparece una parálisis flácida transitoria en el cuello de las **aves**.

Control y prevención

Si la granja ha estado expuesta a la enfermedad, estas son algunas consideraciones que deben tomarse para desinfectarla **antes de reintroducir a tus animales**:

- Las jaulas deben ser sacudidas con escobas para liberar el mayor número de partículas posible y que puedan salir de las instalaciones.
- Lavar debidamente las paredes y las jaulas con detergentes y desinfectantes.