



Nombre de alumno: Diana Laura Villatoro espinosa

Nombre del profesor: Jhodany Arguello

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: Patología del niño

Grado: 5°

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 de enero de 2021.

DEFINICION

Es el conjunto de maniobras que permiten identificar si un niño esta en situación de parada cardiorespiratoria y realizar la sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria

PASOS

- 1. Verificar el nivel de consciencia del niño:** Preguntar como se encuentra o practicarle leves sacudidas o palmadas, siempre y cuando no tenga problemas del cuello
- 2. Si obtenemos respuesta:** Comprobar su estado y pedir ayuda si fuera necesario
- 3. Si no obtenemos respuesta:** Pedir ayuda, si hay alguien cerca, o si no hay nadie no debemos de dejarlo solo
- 4. Colocar al niño boca arriba:** Tumbiar al niño sobre una superficie dura y plana con la cabeza boca arriba y extremidades alineadas
- 5. Abrir las vías respiratorias:** Para la apertura se realizara la maniobra frente-mentón destinada a facilitar la entrada de aire por la boca
- 6. Valorar y comprobar la respiración del niño:** Poner el oído cerca de la nariz y boca del niño, observar el tórax para comprobar si respira. Observamos, escuchamos y sentiremos durante no más de 10 segundos
- 7. Si respira:** Lo colocaremos en posición lateral se seguridad siempre que sea posible y llamar a urgencias
- 8. si el niño no respira:** Iniciamos respiración artificial (boca-boca) • Abrir vías aéreas • Tapar la nariz del niño • Inspirar profundamente
- 9. Comprobar signos de vida:** Debemos observar signos vitales de tos, movimientos o respiración Si hay signos de vida Seguir con ventilación boca a boca a un ritmo de 20 minutos Si no hay signos de vida iniciaremos compresiones torácicas
- 10. Realizar las compresiones torácicas:** El objetivo es comprimir el tórax contra la espalda de forma rítmica para conseguir que la sangre salga del corazón y circule por el cuerpo
- 11. Realizar las compresiones torácicas:** Llamar a urgencias y comprobar signos de vida. Si al cabo de un minuto de empezar la RCP, seguimos solos y no hemos llamado a urgencias debemos de hacerlo ahora
- 12. Finalizamos RCP:** Debemos continuar combinando 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones, hasta que llegue ayuda profesional, la victima se recupere