

Nombre de alumno: José Alejandro Villagrán Pérez

Nombre del profesor: MARIA CECILIA ZAMORANO RODRIGUEZ

Nombre del trabajo: Super nota

Materia: Ginecología y obstetricia

Grado: 5°

Grupo: "B"

3.1. Puerperio patológico. Choque séptico.

¿Qué es?

- Periodo del parto, hasta primera menstruación



Ausencia de producción de leche o producción en cantidad insuficiente para el crecimiento del bebé

Cambios en los fenómenos tromboembólicos

Patología de lactancia

Infección puerperal

Patologías con mayor mortalidad

Patología vascular

Patología psiquiátrica

Infecciones como temperatura alta, infección de episotomía, mastitis, complicaciones respiratorias, etc.



Trastornos emocionales en mujeres recién paridas

3.2. Embarazo múltiple, presentación pélvica y situación transversal.



¿Qué es?

- Desarrollo de dos o más bebés en el útero



3.3. Distocias mecánicas

¿Qué es?

- Anormalidad con el acomodo o tamaño del bebé en el parto



Occipucio posterior

Posición anormal con el cuello fetal un poco desflexionado

Posición con la cabeza hiperextendida, designada por el mentón en posición posterior

Frente o rostro

Presentación de nalgas

Presentación que deja la cabeza atrapada y comprimido el cordón, debido a la posición del bebé

Condición poco común que deja el vértice del hombro atascado en la sínfisis pubiana


Distocia de hombro

Posición transversa

Posición que deja el eje largo del feto oblicuo, a diferencia del eje paralelo largo de la madre

Solo puede ser aplicado en el periodo de dilatación y de borramiento

3.4. Distocias dinámicas



Fase del primer periodo del trabajo de parto, dura 20 horas en nulíparas y 14 en multíparas.

No hay dilatación en 2 o más horas, esto durante la fase activa

Fase donde el descenso es menos a 1 cm/hora en nulíparas y 2 cm/hora en multíparas

Ausencia del descenso en el segundo estadio de parto, esto en 1 hora

Fase latente prolongada

Fase activa prolongada

FASES

Detección secundaria de dilatación

Fase desaceleradora prolongada

Prolongación del descenso

Falla del descenso

FASES

Detención del descenso

Desproporción cefalopelvica

Fase del primer periodo que dura de 5 a 8 horas en nulíparas y de 3 a 5 horas

Fase que desacelera 1 hora en multíparas y 3 en nulíparas

Descenso no existente en un segundo periodo de parto, esto en 1 hora de ausencia

Existen dos criterios a tomar, los cuales son el cese secundario de la dilatación y la falla del descenso


3.5 Fórceps

¿Qué es?
Son herramientas para
ayudar a mover al bebé
en la vía de parto

¿Cuándo usarlo?
Cuando exista dilatación
y se este pujando, y
sienta que necesita ayuda



Características:
Cucharas parecidas a ensaladas
Guía la cabeza del bebé
Otra técnica, parto con ventosa



Riesgos de la madre
Desgarros
Problemas para orinar
Problemas para defecar



Riesgos para bebé
Moretones
Hinchazón
Nervios lesionados
Sangrado dentro de la
cabeza

3.6. Operación Cesárea

¿Qué es?
Operación que sirve para
la extracción de el feto y
la placenta

Adherencias
en cicatriz

Complicaciones
postoperatorios

Trombosis

Embolias

Hemorragias

Infecciones

Cesárea electiva o
programada

Cesárea interparto

Cesárea según
zona de corte

Cesárea corporal

Cesárea segmentaria

Cortes



Incisión
horizontal



Incisión
vertical



Incisión en
forma de T

Tipos


3.6.1. Aborto

Definición Es el proceso mediante el cual la gestación del embrión es interrumpida por causas variadas	Aborto espontáneo o natural Por malformaciones, pólipos, fibromas, cáncer, etc.
Clasificación	
Aborto provocado Aborto producido por imprudencias	Aborto terapéutico Se realiza cuando el producto se considera muerto y peligroso



3.7. Embarazo ectópico:

¿Qué es?
Embarazo donde la implantación del óvulo ocurre de manera equivocada





Síntomas Dolor abdominal Retraso menstrual Sangrado vaginal	Tratamientos Tratamiento medicamentoso Tratamiento quirúrgico
Características	
Posibles causas Tabaquismo, falla en ligaduras, cirugías de trompas, DIU, embarazo antes de 18 años, etc.	Embarazo sin futuro Causa lesiones graves Riesgo alto de muerte Entre el 1 y 2%



3.8. Enfermedad tromfoblastica gestacional

¿Qué es?

• Tumor que rodea al blastocito y se desarrolla en el corion y el amnios




Tratamiento

Extirpación tumoral

Diseminación tumoral

Quimioterapia




Anticoncepción postratamiento



3.9. Placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta normoincorta

Definición
Desprendimiento prematuro de la placenta normoincorta, esto antes de las 20 semanas de gestación

Principales factores de riesgo






3.10. Infección de vías urinarias y embarazo

Definición

Son infecciones con presencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario

Signos y síntomas



3.11. Amenaza de parto prematuro.

¿Qué es?
Presencia de contracciones cada 4 en 20 min, esto en la semana 22-37

Causas y factores

Preeclamsia


Enfermedad sistémica grave

Cusas uterinas

Placenta previa

Líquido amniótico corioamnionitis

Sufrimiento fetal agudo



3.12. Embarazo de alto riesgo.

¿Qué es?
Embarazo con alto riesgo
de desarrollar
complicaciones



Prevención



Cita
preconcepcional

Atención
prenatal regular

Evitar
adicciones

Dieta
saludable

Evitar estrés y
actividad física

Estudio
genético

Aumento de
peso

Hipertensión

Diabetes

Obesidad

Hipertiroidismo

Trastornos
mentales

Cáncer


Problemas
cardiacos

ETS


Factores
contribuyentes



Instrumental legrado




Pinza Bozeman 26 cm




Set de dilatadores de Hegar 3mm A 18mm




Cureta de nova 23 cm x 4 mm



Pinza de tenáculo Schoerer 24cm



Especulo vaginal de Graves medianos




Pinza de Schubert para biopsia



Histometro de Sims graduado



Pinza de restos Placentarios Pozzi



Pinza Foerster

Instrumental legrado



Cureta Fenestrada de Sims No 1




Cureta Fenestrada de Sims No 2



Cureta Fenestrada de Sims No 3



Cureta Fenestrada de Sims No 4



Cureta Fenestrada de Sims No 5



Cureta Fenestrada de Sims No 6

Instrumental de cesarea





Separador
Farabeuf



Pinza campo
Backhaus




Pinzas campo Backhaus



Pinzas campos Backhaus



Tijera de Mayo
recta de 17cm,



Tijera metzenbaum
curva 18cm




Portaguisa mayo
Hegar 18 cm



Tijera metzenbaum
curva 20 cm.



Cánula de succión
Yankaver standard



Portaguisa Mayo
Hegar 20cm



Valva maleable mediana

Instrumental de cesàrea



Pinza disección
sin dientes




Pinza disección
con dientes




Pinza disección
Buser



Pinza Kelly
curva



Pinza rochester
Pean curva




Pinza Allis 5x6
dientes 19cm.



Mango de bisturí No4




Reñonera




Bandeja de
acero inoxidable


Forceps




Forceps Kielland




Forceps Tarnier



Forceps Simpson



Forceps Piper



Forceps Elliot



Forceps Barton

Bibliografía:

Antología de ginecología y obstetricia. PDF. Recuperado el 12 de marzo del 2021. UDS. Universidad del sureste.