

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**  
**PASIÓN POR EDUCAR.**

**NOMBRE DEL ALUMNO:**  
ROSA ISELA BAUTISTA GÓMEZ.

**NOMBRE DEL MAESTRO (a):**  
JUANA INÈS LÓPEZ HERNÁNDEZ

**MATERIA:**  
ENFERMERÍA CLÍNICA II

**GRADO: 5TO CUATRIMESTRE. GRUPO:**  
“D”

**CUADRO SINOPTICO.**

**VILLAHERMOSA, TABASCO, ENERO DE 2021**

ENFERMERIA  
MEDICO-  
QUIRURGICA  
DEL APARATO  
RESPIRATORIA

ENFERMEDAD  
OBSTRUCTIVA  
CRONICA (EPOC)

Relevantes por su impacto en la mortalidad discapacidad y calidad de vida

Factores de riesgo

Exposición a ciertos gases o emanaciones en el sitio del trabajo

Exposición a cantidades considerables de contaminación o humo directo de cigarrillo

Uso frecuente de fuego para cocinar sin la ventilación apropiada.

Trastorno que provoca las vías respiratorias se hinchen y estrechen.

Asma bronquial

Síntomas: se pueden desencadenarse por la inhalación de sustancias llamadas alérgenos o desencadenantes.

Incapacidad del aparato respiratorio para mantener un adecuado intercambio de gaseoso necesario para atender las necesidades metabólicas del organismo.

Cuando en reposo, vigilia y respirando aire ambiente, la presión arterial de O<sub>2</sub> (PO<sub>2</sub>) es menor de 60 mmHg y/o la presión arterial de CO<sub>2</sub> (PCO<sub>2</sub>) es mayor de 45 mmHgI.

INSUFICIENCIA  
RESPIRATORIA,  
SINDROME DE  
DISTRES  
RESPIRATORIO  
DEL ADULTO  
(SDRA).

Clasificación de la insuficiencia respiratoria

IR hipoxémica o parcial o tipo I: cuando solo existe hipoxemia con normocapnia.

IR hipercapnia o global o tipo II: en la que existe hipercapnia además de la hipoxemia.

ENFERMERIA  
MEDICO-  
QUIRURGICA  
DEL APARATO  
RESPIRATORIA

Tromboembolismo  
pulmonar (TEP).  
Hipertensión  
pulmonar.

Obstrucción del tronco de la arteria pulmonar o de alguna de sus ramas, por un trombo desprendido de su sitio de formación y proveniente del sistema venoso.

Factores de riesgo

Tromboembolismo venosos previo.

Cirugía reciente (neurocirugía, cirugía ortopédica, cirugía oncológica pélvica, abdominal o torácica, trasplante renal y cirugía cardiovascular):

Obesidad.

Terapia hormonal de reemplazo postmenopáusica

Anticonceptivos orales

Condiciona una obstrucción vascular que puede ser total o parcial, el primer evento respiratorio es la existencia de una zona con adecuada ventilación y mal perfundida y el segundo evento es la obstrucción de la vía aérea pequeña y ductos alveolares para disminuir el espacio muerto alveolar, el tercer evento y más importante es la hipoxemia arterial.

Traumatismos  
torácicos. Neumo-  
hemotorax.  
Obstrucción de vía  
aérea.

Son causa importante de morbilidad y mortalidad, siendo directamente responsables de un 20-25% de las muertes debido a traumatismos y contribuyen otro 25% en muertes.

Clasificación

Abiertos.



Son aquellos en los que existe una continuidad de la pared torácica, con disrupción de la pleura visceral, acompañándose, generalmente, de laceración y contusión del pulmón subyacente

Cerrados



No hay solución de continuidad de la pared torácica.