



MATERIA:
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NOMBRE DEL DOCENTE:
LUIS MANUEL CORREA BAUTISTA

TRABAJO:
MAPA CONCEPRUAL: GINECOLOGIA GENERAL

NOMBRE DEL ALUMNO:
KARLA DEL ROCIO CHABLE REYES

LUGAR Y FECHA:
CARRETERA VILLAHERMOSA-AEROPUERTO
KM. 10+400 POB. DOS MONTES A 09 DE ABRIL DEL 2021

GRADO: 5° CUATRIMESTRE" D"

LIC. EN ENFERMERIA

GINECOLOGIA GENERAL

METODOS DE EXPLORACION GINECOLOGICA

Anamnesis

Historia menstrual: edad de la menarquia, bubarquia, terarquia

Historia obstétrica: gravidez, número de embarazos, complicaciones. Etc.

Palpación

Corresponde a la palpación fetal, a través del abdomen materno, para identificar la situación, presentación, posición y actitud fetal.

Exploración interna

Inserción de espéculo e inspección de cérvix o cuello uterino

LABORATORIO Y GABINETE

Son estudios que se hacen durante el embarazo para controlar la salud de la madre y del bebe, permite detectar afecciones que puede poner al bebe en riesgo, los exámenes también permiten detectar malformaciones congénitas

TRANSTORNOS MENSTRUALES

Alteraciones de los días del ciclo

Ciclos menstruales de más o menos días

Cambios en la característica de la regla

Menstruaciones que duran menos o más cantidad

Regla que persiste todo el mes

Reglas que desaparecen: amenorrea

AMENORREA PRIMARIA

Ciclo menstrual normal: es la acción coordinada de las señales centrales

Dismenorrea: corresponde al dolor abdominal o pélvico

Dismenorrea primaria: el dolor puede presentarse 48 a 72 hrs previas a la menstruación

Dismenorrea secundaria: aquí se encuentran patologías orgánicas que explica el dolor

AMENORREA SECUNDARIA, DISMENORREA Y TENSION PREMENSTRUAL

Las alteraciones en la ciclicidad menstrual son un motivo frecuente de consulta durante la adolescencia, es importante que el medico tenga los conceptos claros sobre lo que se considera normal a esta edad, para poder asesorar a la paciente y a sus padres. Se debe tener en consideración que las alteraciones menstruales pueden ser la manifestación de una enfermedad crónica o aguda

MIOMATOSIS UTERINA. ENDOMETRIOSIS

Los miomas o leiomiomas son tumores benignos que se forman a consecuencia de una proliferación alterada de las fibras musculares del miometrio. Afectan al útero en su forma, volumen y función, estos suelen ser asintomáticos

La miomatosis uterina suele diagnosticarse en la tercera o cuarta década de la vida esto se debe fundamentalmente al papel de la progesterona en la génesis de esta patología, aunque existen varios tratamientos, tan solo con su extirpación se consigue hacerlos desaparecer

ENFERMEDAD PELVICA INFLAMATORIA AGUDA Y CRONICA. CANCER CERVICO-UTERINO

Estas son sometidas a un creciente riesgo de molestias en el hemiabdomen inferior, embarazo ectópico, por lo general es consecuencia de una infección que se da ya sea a partir de una ITS o una infección polimicrobiana en relación con vaginosis. Los síntomas pueden ser dolor abdominal bajo, aumento de flujo vaginal, sangrado anormal, vómitos

CANCER DE ENDOMETRIO, TRANSTORNO DE LA ESTATICA PELVI-GENITAL E INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO

El cáncer de endometrio es la neoplasia maligna ginecológica más común en los estados unidos. El envejecimiento, es el factor de riesgo más importante para la mayoría de los cánceres, el sangrado vaginal irregular es el signo de presentación más común del cáncer de endometrio

INFECCIONES E INFESTACIONES CERVICO-VAGINALES

Consiste en la colonización y multiplicación microbiana, habitualmente bacteriana, a lo largo del trayecto del tracto urinario. Se denomina pielonefritis si afecta al riñón y la pelvis renal cistitis, si implica la vejiga, uretritis si afecta a la uretra y prostatitis si la infección se localiza en la próstata

TUMORES DE OVARIOS

En los ovarios puede desarrollarse tumores benignos o malignos quísticos o solidos de tipo epitelial, conjuntivo, funcionantes. Los verdaderos procesos neoplásicos presentan una constitución histológica muy diversa de origen epitelial. Se conoce que los tumores benignos de ovario no constituyen un grupo bien definido y alguno de ellos puede malignizarse en su evolución, los síntomas que más refieren los pacientes incluyen cierto malestar abdominal, seguido de distensión abdominal a causa de la presencia de ascitis o una masa tumoral que aumenta de tamaño, así como también síntomas gastrointestinales

CLIMATERIO Y MENOPAUSIA, ESTERILIDAD E INFERTILIDAD CONYUGAL

El climaterio es un acontecimiento fisiológico de la vida de la mujer que se manifiesta de una forma evidente en el aparato genital por la pérdida de la función reproductiva, pero ese cambio incluye numerosos procesos que ocurren en diferentes órganos y sistemas.

La menopausia es un estado fisiológico de la mujer, parte del proceso natural de envejecimiento, caracterizado por el cese de secreción hormonal ovárica dando lugar a cambios que afectan el aparato urogenital

PLANIFICACION FAMILIAR

Gracias a la planificación familiar las personas pueden decidir cuándo es el momento de ser padres así como el número de hijos que deseen tener. Dentro de los métodos de planificación se encuentra tanto los métodos que impiden la gestación (los anticonceptivos) como aquellos que pretenden aumentar las posibilidades de conseguirla (tratamientos de fertilidad)

¿Que es la planificación familiar?

Incluye todos los procedimientos deseados a controlar la reproducción. Se debe considerar tanto para evitar un embarazo no deseado como para conseguirlo

METODOS DEFINITIVOS, PATOLOGIA BENIGNA DE LA GLANDULA MAMARIA Y TRATAMIENTO.PATOLOGIA MALIGNA DE LA GLANDULA MAMARIA Y TRATAMIENTO

MASTITIS

La mastitis es una enfermedad multifactorial ocasionada por factores físicos, químicos, mecánicos o infecciosos que causan lesiones del tejido interno de la glándula mamaria provocando una inflamación

MASTITIS SUBCLINICA

Los principales patógenos causantes de mastitis subclínica son estreptococos y estafilococos, es importante utilizar combinaciones de drogas para obtener mejores resultados.

CONTROL Y PREVENCION

La higiene es el principal factor que ayudara a prevenir y controlar la presencia de mastitis. Los tipos más comunes de cáncer de mama son:

- Carcinoma ductal infiltrante
- Carcinoma lobulillar infiltrante