



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LIC. EN ENFERMERIA

FISIOPATOLOGIA

ACTIVIDAD:

MAPAS CONCEPTUAL

ALUMNO:

CARLOS FRANCISCO JIMENEZ OSORIO

DOCENTE:

DR. MANUEL CORREA BAUTISTA

GRUPO:

D

CUATRIMESTRE:

5

GINECOLOGÍA GENERAL

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA.

Estos puntos a continuación son tan importantes para saber el historial de la paciente.

1. Historia Menstrual
2. Historia Obstétrica
3. Costumbres de limpieza
4. Historia Sexual
5. Fecha del último examen ginecológico y resultados de Papanicolaou.

Antes de iniciar, verifique que todos los materiales estén listos y las condiciones generales descritas para el examen ginecológico, tanto de las pacientes, como del médico.

Inserción del espéculo e Inspección del Cérvix o Cuello Uterino. Antes de hacer la exploración interna por medio del espéculo.

LABORATORIO Y GABINETE.

Son estudios que se hacen durante el embarazo para controlar la salud de la madre y del bebé. Permiten detectar afecciones que pueden poner al bebé en riesgo de problemas como un parto prematuro si no reciben tratamiento.

- ECOGRAFÍA
- MUESTREO DEL VELLO DEL CORIÓNICO
- RIBADO DEL PRIMER TRIMESTRE

- ❖ Hepatitis C
- ❖ Citomegalovirus (CMV)
- ❖ Enfermedad de Tay-Sachs
- ❖ Tiroidea
- ❖ Toxoplasmosis

TRASTORNOS MENSTRUALES

Los trastornos menstruales se define en función de las variaciones que pueden aparecer en un ciclo menstrual o menstruación normal. Basándonos en este concepto, podemos decir que existen variaciones que pueden afectar a: Cambios en las características de las reglas: calidad de las mismas y de los ciclos menstruales.

Algunos de los ejemplos son los que dire a continuación, ciclos de 20 días o de 40 días. El primer día del ciclo se considera el primer día de la regla: sangrado habitual en una regla normal. Los ciclos normales duran, aproximadamente, unos 28 días aproximadamente con variaciones de algunos días antes o después.

AMENORREA PRIMARIA

El ciclo menstrual normal resulta de la acción coordinada de las señales centrales (hipotálamo - hipófisis) sobre el ovario, produciendo un crecimiento y descamación sincrónica del endometrio,

Este problema es mas frecuente en la adolescencia

Es una causa frecuente de consulta en el grupo de adolescentes, con un porcentaje de ausentismo escolar entre 14 y 52% según las distintas series.

Se pueden presentar de la siguiente manera.

- Dismenorrea primaria
- Dismenorrea secundaria

AMENORREA SECUNDARIA

Las alteraciones en la ciclicidad menstrual son un motivo frecuente de consulta durante la adolescencia, en el Programa de Ginecología de la Adolescencia en Clínica

Se toma en consideración que las alteraciones menstruales pueden ser la manifestación de una enfermedad crónica o aguda importante. Incluso la ciclicidad menstrual se ha considerado como un signo vital más durante la adolescencia.

GINECOLOGÍA GENERAL

MIOMATOSIS UTERINA

INFECCIONES CÉRVICO-VAGINALES

TUMORES DE OVARIO

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Este problema suele diagnosticarse en la tercera y cuarta década de la vida. Los miomas son muy raros antes de la pubertad, y después de la menopausia no suelen aparecer nuevos miomas y, los que tenga la paciente en ese momento, probablemente disminuirán de tamaño, aunque no desaparecen

Esto mas que nada se refiere a una infección del tracto urinario consiste en la colonización

La infección del tracto urinario (ITU) consiste en la colonización y multiplicación microbiana, habitualmente bacteriana, a lo largo del trayecto del tracto urinario.

Son los más complicados de todos los problemas diagnósticos. La sutil transición de una lesión benigna a otra maligna en un ovario.

La sutil transición de una lesión benigna a otra maligna en un ovario, es uno de los grandes misterios de la ginecología.

Como bien se conoce, el ovario es un órgano de caracteres polimorfos interrelacionados. Diversos factores genéticos, embriológicos, estructurales y funcionales, experimentan una interacción de la cual puede emanar una enorme capacidad tumoral, ya sea benigna o maligna.

la planificación familiar incluye todos los procedimientos destinados a **controlar la reproducción**. Los principales objetivos de estas prácticas son los siguientes:
⇒ Poder elegir cuándo es el momento idóneo para tener un hijo.

⇒ Poder decidir el número de hijos que se desean.

⇒ Poder determinar el intervalo de tiempo entre embarazos, es decir, la diferencia de edad entre los hermanos.

- Tomografía computarizada pélvica y abdominal
- Resección histeroscópica.
- Operaciones laparoscópicas.
- Cirugía tradicional.

Se diagnostican cuando aparecen menos de 3 en un año, y el tratamiento es el de la cistitis simple no complicada mencionado más arriba. Muchas mujeres pueden instruirse para iniciar el tratamiento empírico al comienzo de los síntomas.

Crecimiento lento del abdomen, síntomas compresivos, dolor abdominal agudo o subagudo, sobre todo cuando se complican por torsión (frecuente en los benignos),

El advenimiento de la ecografía y su uso habitual, ha hecho que el diagnóstico de dichos tumores sea aún más frecuente y esta haya adquirido una función preponderante en la práctica ginecológica, ya que constituye el mejor método para explorar los cambios que ocurren en el aparato reproductor.

Esto tiene un propósito y no es mas que limitar el número de embarazos que la mujer va a llevar a término, así como el espacio entre ellos, la salud y el bienestar materno van a mejorar en gran medida. Del mismo modo