


**PRESENTA EL ALUMNO:**

ANA KAREN ARGUELLO SOLIS

**GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:**

8vo CUTRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN  
ENFERMERIA ESCOLARIZADO



**DOCENTE:** MARCOS JHODANNY ARGUELLO  
GALVEZ

**MATERIA :** Seminario de tesis

**FECHA:** 14 /Febrero /2021

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El cáncer cervicouterino es una causa común en las mujeres en las cuales la mayoría de ellas no se trata es una enfermedad de las células cancerosas (malignas) en los tejidos del cuello uterino suele crecer lentamente un periodo de tiempo antes de que se encuentra en las células cancerosas en el cuello uterino sus tejidos experimentan cambios y empieza a aparecer células anormales es un proceso conocido como displasia.

Hoy en día se vive una demanda que se va incrementando la tasa de mortalidad con el paso del tiempo no reduce las cifras esto debido a la falta de información la falta de amor Así mismo económico y social no es diagnosticado a tiempo porque es asintomatico cuando presenta los síntomas la enfermedad Ya está avanzada por eso es importante realizar cada año a la citología vaginal (Papanicolaou) pero la realidad es que la mayoría de las mujeres creen estar bien y eso hace probar que hay un índice de muerte en nuestra sociedad.

El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo con estimaciones de 493. 000 casos y 274000 fallecimientos en el año 2002 cerca del 83% de los casos se producen en países en vías de desarrollo donde el cáncer cervical representa el 15% de los cánceres femeninos En España se produce una mortalidad de 700 casos al año.

El esfuerzo por eliminar el CCU empezó hace más de 50 años con la introducción de la prueba de papanicolaou El cribado basado en la citología ha reducido hasta un 75% la incidencia del CCU en los países que han podido implementar y sostener programas de cribado centralizado con control de calidad.

En junio de 2006 la Food and drug administration Federal de los Estados Unidos de América autorizó una vacuna tetravalente contra el bph que protege tanto contra las lesiones precursoras del cc como contra las lesiones genitales externos condilomas y papilomas causadas por los tipos de pH 6 11 16 y 18 Igualmente se presentó en el mismo año una solicitud de autorización en Europa para una vacuna bivalente contra los VPH 16:18 la autorización de las vacunas contra el VPH pueden considerarse un nuevo hito en la lucha contra el cc ambas vacunas han recibido el apoyo de la OMS para su implementación en países desarrollados

El gobierno desempeña un papel importante no sólo en la financiación directa de la vacunación sino también en la negociación de contratos con los fabricantes que permitan que se apliquen precios más económicos para las vacunas dispensadas en el sector público. El precio de las tres dosis de la vacuna cuadrivalente en Estados Unidos es de 360 aproximadamente 288 € sin incluir costos de vacunación e incluso después de instituir los programas de vacunación y lograr niveles de razonable cobertura no se podrá prescindir de los programas de cribado del cáncer de cuello uterino. Se desconoce si será necesario administrar dosis de recuerdo en el futuro además Hay que seguir trabajando en los programas de salud sexual y reproductiva los estudios con vacuna de segunda generación están ya en una fase avanzada.

## **PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 6**

¿ Cuáles son las características sociodemográficas y clínicas de los casos de cáncer cervicouterino del año 2017 al 2018 registrados en la población del barrio de Santa Cecilia en la ciudad de Comitán de Domínguez?

## OBJETIVOS

### GENERAL

- Conocer las características sociodemográficas y clínicas de los casos de cáncer cervicouterino del año 2017 al 2018 registrados en la población del barrio de santa Cecilia en la ciudad de comitan de Domínguez

### ESPECÍFICOS.

- Censar a las mujeres de distintos barrios para ver quienes no se realizan la prueba de citología vaginal (Papanicolaou) y darles información sobre ello
- Identificar los factores que limitan la confirmación del diagnóstico en pacientes con lesiones precursoras de Cáncer cervicouterino detectadas por las Brigadas
- Identificar los factores de los Servicios de Salud que limitan la confirmación del diagnóstico en pacientes con lesiones precursoras de Cáncer cérvicouterino
- Detectar los factores de la mujer que limitan la confirmación del diagnóstico en pacientes con lesiones precursoras de Cáncer cérvicouterino

## JUSTIFICACIÓN

El grupo poblacional más afectado con respecto a este tipo de lesiones son las mujeres en edad reproductiva, por lo que es crucial que el tratamiento de estas lesiones con procedimientos más extensos sea cada vez más individualizado dado el incremento de complicaciones en el seguimiento posterior así como en futuros embarazos: Es por esto que surge la necesidad de conocer los factores predictivos de enfermedad residual en el cono central complementario y así individualizar la terapéutica.