



Universidad Del Sureste
Carretera Villahermosa tabasco Pob.Dosmontes

Docente: Gabriela Priego Jiménez

Alumno: José Leonardo Arias Cruz

Materia: Patología Del Niño Y Adolescente

Grupo: G

Cuatrimestre: 5to

Producto: Cuadro Sinóptico

PATOLOGIA

ESPINA BIFIDA

Defecto de nacimiento en el cual la médula espinal de un bebé no se desarrolla correctamente

los síntomas se pueden observar en la piel sobre el defecto de la columna. Incluyen vellosidad anormal, una marca de nacimiento o una protuberancia sobre la zona de la médula espinal

El tratamiento consiste en cirugía. Cuando se necesita tratamiento, se realiza mediante cirugía para cerrar el defecto. Otros tratamientos se concentran en controlar las complicaciones

MENINGOCELE

Ocurre cuando la médula espinal de un bebé no logra desarrollarse o cerrarse correctamente durante la gestación

los síntomas se pueden observar en la piel sobre el defecto de la columna. Incluyen vellosidad anormal, una marca de nacimiento o una protuberancia sobre la zona de la médula espinal

Cuando se necesita tratamiento, se realiza mediante cirugía para cerrar el defecto. Otros tratamientos se concentran en controlar las complicaciones

HIDROCEFALIA

Acumulación de líquido en las cavidades del cerebro. El líquido adicional aumenta la presión en el cerebro y puede causar daño cerebral. Es más común en los niños pequeños y los adultos de edad avanzada

La hidrocefalia se caracteriza por un aumento del tamaño de la cabeza en los recién nacidos. Los adultos y los niños experimentan dolor de cabeza, vista defectuosa, dificultades cognitivas, incontinencia y pérdida de la coordinación.

El tratamiento depende del estado de gravedad del paciente. El tratamiento consiste en colocar quirúrgicamente un conducto (shunt) en un ventrículo para drenar el exceso de líquido.

EPILEPSIA

Trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro, lo que provoca convulsiones.

Durante una convulsión, una persona experimenta comportamientos, síntomas y sensaciones anormales, incluso la pérdida del conocimiento. Hay pocos síntomas entre convulsiones.

El tratamiento consiste en anticonvulsivos. La epilepsia suele ser tratada con medicamentos y, en algunos casos, cirugía, dispositivos o cambios en la dieta.

Traumatismo Cráneo Cefálico

Las lesiones cerebrales traumáticas se producen como resultado de una lesión deportiva grave o un accidente automovilístico.

Los síntomas inmediatos o diferidos pueden incluir confusión, visión borrosa y dificultad para concentrarse. Los bebés pueden llorar sin parar o mostrarse irritables.

Los síntomas inmediatos o diferidos pueden incluir confusión, visión borrosa y dificultad para concentrarse. Los bebés pueden llorar sin parar o mostrarse irritables.

El tratamiento depende del estado de gravedad del paciente
El tratamiento puede incluir reposo, medicamentos y cirugía.

Principales Problemas De Intoxicación En Niños Menores Cinco Años.

Productos del hogar

Son la 2ª causa de intoxicación pediátrica hospitalaria. En la mayoría de los casos se trata de niños menores de 3 años

- Paracetamol
- IMAO
- Hierro
- Litio
- Setas hepatotóxicas

Sospecha de intoxicación

Alteraciones en los signos vitales
Neurológicas: orientación, coordinación, tamaño de pupila

Estado General: Coloración, Signos traumáticos, piel y mucosa