



Nombre: Liri Yanet lopez Pérez

Materia: Ginecología obstétrica

Grupo: G

Grado: 5to Cuatrimestre

Ginecología general

Métodos de exploración ginecológica.

1. Historia Menstrual
2. Historia Obstétrica
3. Costumbres de limpieza
4. Historia Sexual
5. Fecha del último examen ginecológico y resultados de Papanicolaou

Miomatosis uterina. Endometriosis.

Los miomas, o leiomiomas, son tumores benignos que se forman a consecuencia de una proliferación alterada de las fibras musculares del miometrio (capa muscular del útero) dependiente de las hormonas femeninas, y constituyen la neoplasia benigna más frecuente del aparato genital femenino. Afectan al útero en su forma, volumen y función.

Laboratorio y gabinete.

Los exámenes prenatales son estudios que se hacen durante el embarazo para controlar la salud de la madre y del bebé. Permiten detectar afecciones que pueden poner al bebé en riesgo de problemas como un parto prematuro si no reciben tratamiento. Los exámenes también les permiten a los profesionales del cuidado de la salud detectar deformaciones congénitas o una anomalía en los cromosomas

Infecciones e infestaciones cérvico-vaginales.

La infección del tracto urinario (ITU) consiste en la colonización y multiplicación microbiana, habitualmente bacteriana, a lo largo del trayecto del tracto urinario.

Trastornos menstruales

Menstruaciones que duran menos o más cantidad de lo habitual: en ocasiones hay reglas que sólo duran un día u otras que duran más de 7 días.

Reglas que desaparecen: amenorrea primaria o secundaria. Reglas que persisten todo el mes. En estos casos siempre se debe descartar patología asociada. Sangrados muy poco abundantes. Los sangrados muy abundantes

Tumores de ovario

El ovario es un órgano de caracteres polimorfos interrelacionados. Diversos factores genéticos, embriológicos, estructurales y funcionales, experimentan una interacción de la cual puede emanar una enorme capacidad tumoral, ya sea benigna o maligna.

Amenorrea primaria

Dismenorrea
Proviene del griego que significa flujo menstrual difícil, corresponde al dolor abdominal o pélvico que se presenta durante la menstruación.

Dismenorrea primaria Se caracteriza por presentarse generalmente 6 y 12 meses después de la menarquia, el dolor suele presentarse 48 y 72 horas previas a la menstruación, persistiendo por 1 a 3 días.

Cáncer de endometrio trastornos de la estática pelvi- genital e incontinencia urinaria de esfuerzo

En general, el cáncer de endometrio se diagnostica y trata en estadio temprano. La enfermedad cardiovascular es la causa más común de muerte en pacientes de cáncer de endometrio debido a los factores de riesgo metabólico relacionados.