



**UNIVERSIDAD
DEL SUR**

CARRERA: LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

MATARÍA: FISIOLOGÍA

TAREA: "HEPATITIS"

DOCENTE: BASILIO ROBLEDO MIGUEL

ALUMNO: CARRASCO GONZÁLEZ SALOMÉ

Grado: 5^a Grupo: "A"

**TAPACHULA, CHIAPAS
JUEVES 11 DE MARZO DEL 2021**

HEPATITIS

Es una inflamación del hígado, causada por el virus de la hepatitis

VIRAL

Inflamación del hígado, causada por varios tipos de agentes virales

TIPOS DE HEPATITIS

- A
- B
- C
- D
- E

Su transmisión ocurre de forma fecal - oral, ingestión de agua o alimentos contaminados, transmisión sexual, y vía parenteral-

Es transmisible de forma parenteral, sexual, sanguínea, perinatal, percutánea

Transmitible de forma parenteral, sanguínea, perinatal, sexual, percutánea

Transmisible de manera parenteral, sexual, sanguínea, perinatal, percutánea y

Su transmisión es oro - fecal, sexual

INFLAMACIÓN HEPÁTICA

Sintomas y signos

Pérdida de apetito, náuseas, vómitos, sensibilidad abdominal, fiebre, fatiga, debilidad, ascitis, cambios de comportamiento, acumulación de toxinas que el hígado debe destruir o eliminar.

Diagnostico

Análisis de sangre, ecografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, biopsia de hígado

tratamiento

Evitar el consumo de alcohol, asesoramiento psicológico, consumo de prednisolona.

Factores de riesgo

Sexo, obesidad, factores genérico, raza, origen étnico, consumo excesivo de alcohol. Pentoxifilina

NO ALCOHÓLICA

Enfermedad en la que se acumula grasa en el hígado

Sintomas y signos

La mayoría son asintomáticos y en algunos suele presentarse astenia, malestar general, dolor en el cuadrante superior derecho, hepatomegalia. En fibrosis avanzada hepática avanzada, puede desarrollar esplenomegalia, hinchazón abdominal (ascitis), bazo agrandado, palmas rojizas, color amarillento en la piel (ictericia).

Diagnostico

Análisis físico, análisis de sangre, biopsia de hígado, ecografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, elastografía transitoria, elastografía por resonancia magnética.

Tratamiento

Mantener una dieta saludable, mantener el peso adecuado, hacer ejercicio, consumo de vitamina E, evitar el consumo de alcohol

Factores de riesgo

Colesterol alto, niveles altos de triglicéridos en la sangre, síndrome metabólico, obesidad, síndrome ovárico poliquístico, apnea del sueño, diabetes tipo 2, hipotiroidismo, hipopituitarismo.

Sintomas y signos

Ictericia, coluria, acolia, astenia, adinamia, anorexia, a veces febrícula

PRODRÓMICO O PREICTÉRICO: anorexia, náuseas, vómitos, fatiga, artralgia, mialgia

PERIODO ICTÉRICO: hepatomegalia y purito intenso

PERIODO DE CONVALECENCIA: mejoría del estado general, recuperación del apetito, desaparición de ictericia, recuperación clínica completa

Diagnostico

Ecografía
Biopsia

Tratamiento

Prevenir con la vacuna del hepatitis.

Factores de riesgo

Por contacto con secreciones saliva, semen, secreción vaginal, orina, transmisión sexual.