

PRESENTACIÓN.



UNIVERSIDAD DEL SURESTE.

CARRERA: Lic. en Enfermería

MATERIA: Patología del niño y adolescente.

ACTIVIDAD 1: Valoración del recién nacido.

UNIDAD I: Padecimientos infectocontagiosos en los niños.

DOCENTE: Dr. Gustavo Armando López Cruz

ALUMNA: Deyanira Santiago Pacheco.

MATRICULA: 422419083.

FECHA: 07/01/21.

PASOS A REALIZAR EN LA ATENCIÓN INICIAL DEL RECIÉN NACIDO.

1. Revisar el cuello del bebe que no tenga cordón umbilical (circular del cordón).
2. Recibimiento del bebe.
3. Pinzamiento del cordón umbilical.
4. Aplicar la valoración del ABCDE, que consiste en:
5. Airway: revisar la via area del recién nacido, que si pueda respirar.
6. Breathing: verificar que el recién nacido respire, que realiza el esfuerzo ventilatorio
7. Circulatory: revisar el color de piel y frecuencia cardiaca del recién nacido con la ayuda de un estetoscopio, la frecuencia cardiaca normal debe de ser de 110 – 160 latidos por minuto.
8. Drogas: consultar si la madre consumo algún medicamento antes de las 4 horas del parto
9. Evaluación: inspección general de cualquier problema que pueda ser grave para el recién nacido.
10. Realizar la mnemotecnica PACES, colocar al recién nacido en posición de olfateo la cual le va a permitir respirar correctamente.
11. Aspiración de meconio con una pera de hule, primero se aspira la cavidad bucal y después cavidad nasal.
12. Calentar al recién nacido con la cuna de calor radiante.
13. Secar con una toalla el líquido o secreciones de la piel y con la misma toalla se estimula al recién nacido.
14. Documentación e identificación del recién nacido, se le coloca una pulsera en la pierna izquierda con los datos de la madre y del recién nacido, para que no se presentes confusiones con otros recién nacidos.
15. Profilaxis oftálmica, para prevenir al recién nacido de conjuntivitis neonatal, se le coloca en sus ojos nitrato de plata en gotas al 1%.
16. Profilaxis de vitamina K, para prevenir la enfermedad hemorrágica. Se coloca una inyección de vitamina K en el muslo derecho en la parte anterior.

17. Se coloca una pinza en el cordón umbilical para hacerlo más corto y se corta el cordón restante para prevenir infecciones como la onfalitis.
18. Se envuelve o se cubre al bebe con una sábana para prevenir la hipotermia.
19. Se entrega el recién nacido a la madre, para que reciba lactancia materna.
20. Ya que recibe lactancia se coloca en una cuna y se extrae del cordón umbilical una muestra de sangre, para grupo sanguíneo y pruebas cruzadas.

CUADRO COMPARATIVO

Hallazgos normales en la exploración física del recién nacido.	Hallazgos anormales en la exploración física del recién nacido.
<ul style="list-style-type: none"> —Color de piel rosada o rojiza y acrocianosis en las extremidades (pies). —Textura de la piel lisa, seca, con descamación, presencia de lanugo y vérnix caseoso. — Eritema toxico. — Milios. — Manchas mongólicas. — Caput succedaneum. — Fontanela ya sea en forma de diamante o en forma triangular. — Edema palpebral, pupilas iguales, que reaccionen a la luz. — Cara pequeña, redonda y simétrica. — Labios y encías intactos, pueden presentarse perlas de Epstein. — Ruidos respiratorios de ventilación. — Ruidos cardiacos (pueden presentar soplos). — Mamas crecidas. — Cordón umbilical simétrico, sin masas, hígado palpable por debajo del reborde costal, debe de ser blanco azulado, húmedo, con tres vasos (2 arterias, una vena), no debe presentar sangrado. — Los genitales femeninos deben de estar edematizados, vernix en los pliegues, secreción mucosa, puede haber manchas de sangre. — Los genitales masculinos, el prepucio debe estar adherido al glande, uretra en punta de pene, testículos palpables dentro del saco escrotal. — Columna vertebral recta, intacta, sin masas. — Reflejo tónico del cuello. — Reflejo de presión. — Reflejo de la marcha. — Reflejo del gateo. — Reflejo de búsqueda y succión. — Presión palmar y plantar. — Reflejo de incurvación de tronco 	<ul style="list-style-type: none"> — Piel pálida, con cianosis, ictericia, equimosis y con petequias. — Cefalohematoma. — Hidrocefalia. — Microcefalia. — Labio leporino. — Paladar hendido. — Tiraje intercostal. — Columna vertebral con curvas exageradas. — Mielomeningocele. — Meningocele. — Reflejo de babinski es anormal después de los 2 años.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">— Reflejo de moro.— Reflejo de babinski. | |
|---|--|