



Lic. enfermería

Patología del niño y adolescente

Dr., Gustavo Armando López cruz

E.L.E. Andrea Guadalupe Ramírez Pérez

Tapachula Chiapas

12/02/2021

GASTROENTERITIS INFECCIOSA

Es una infección o inflamación del revestimiento interno (mucosa) del estómago, y el intestino delgado

AGENTE CAUSAL

SIGNOS Y SÍNTOMAS

DIAGNOSTICO

Tratamiento

Virus

Bacterias

Parásitos

Dolores abdominales

Cultivo de las heces

Por sintomatología del paciente

Levofloxacino, Ceftriaxona, Ciprofloxacino y Cotromoxazol

Bacterias

Rotavirus

Escherichia coli

Bacillus cereus

Giardia lamblia

Cryptosporidium

Vómitos

Por sintomatología del paciente

Loperamida, Pepto-Bismol, Kaopectate

Virus

Norovirus

Shigella

Salmonella

Entamoeba histolytica

Nauseas

Cultivo de las heces

Ceftriaxona, Metrodinazol,

Parásitos

Virus de norwalk

Salmonella

Yersinia

Diarrea

Astrovirus y adenovirus entérico

Fiebre y dolor de cabeza

Yersinia

Yersinia

Yersinia

Yersinia

Yersinia

Yersinia

Yersinia


Yersinia

DIARREA

	BACTERIANA	PARASITARIA	VIRAL	POR ALIMENTOS
AGENTE CAUSAL	Escherichia coli enterotoxigénica	Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium sp, Cyclospora cayetanensis, Isospora belli	virus de Norwalk, citomegalovirus, hepatitis viral y Rotavirus	Intolerantes a la lactosa, Fructosa, Endulzantes edulcorantes, Bebidas acidas, Comidas con mucho condimentos.
SIGNOS Y SÍNTOMAS	Fiebre, vómitos, deshidratación, Pérdida de peso, Pérdida de apetito y diarrea acuosa	Nauseas, Fatiga, gases, Cólicos estomacales e hinchazón, Pérdida de peso.	Calambres abdominales, Fiebre, Pérdida de apetito, Pérdida de peso, Vómitos, Deposiciones flojas y acuosas	Vómitos, Dolor o calambres abdominales, Diarrea más de 3 días, Temperatura bucal
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Diarrea con sangre, mucus, pus,	Heces blandas o grasosas Aparecen de 1 a 3 semanas después de la exposición, olor desagradable,	De 1 a 3 días después de contraer la infección	Diarreas líquidas o con sangre
TRATAMIENTO	AINES	Tetraciclinas, Metrodinazol, Nitazoxanida	Loperamida, Pepto-Bismol, Kaopectate,	Electrolitos, Loperamida, Comer cereales, frutas.

SIGNOS

Boca y lengua seca
Ojos y mejillas hundidos
Irritabilidad
Fontanela hundida
Ausencia de lagrimas
Somnolencia o mareos
Piel seca
Orina menos



COMPLICACIONES

Mareos
Cansancio
Hipotensión
Calambres
Contracturas musculares
Convulsiones
Pérdida de conocimiento

DESHIDRATACIÓN EN NIÑOS

A

Alimentación habitual sin importar el tipo de lactancia que se este dando. Solamente se deben limitar azucares simples.



PLAN DE REHIDRATACIÓN

B

Abundante suero mientras persista la diarrea



C

Ir a consulta medica si no hay mejora en 72 hrs. O antes si tiene sed intensa, no come, no bebe, heces liquidas y numerosas, vómitos frecuentes, evacuaciones con sangre.

