



Nombre de la universidad: UDS (Universidad Del Sureste).

Nombre de la carrera: Licenciatura en enfermería.

Materia: Fisiopatología II

Nombre del Maestro: Miguel Basilio Robledo

Nombre de la alumna: Loyda Eunice Hernández Pérez.

Grado y grupo: 5to Cuatrimestre Semiescolarido.

Lugar y fecha: Tapachula Chiapas - 17 de febrero del 2021.

ACALASIA

Enfermedad que afecta los músculos del esófago que impide contraerse y a los músculos esfínter esofágico inferior (EEI) impidiendo la relajación tras la deglución.

Se origina por:

- Alteraciones de las estructuras nerviosas del esófago.
- Autoinmune (diabetes mellitus, lupus, hipotiroidismo etc).
- Agentes infecciosos.
- Genética (personas con síndrome de Down).

Síntomas

- Disfagia ha solido.
- Regurgitación.
- Dolor torácico.

Acalasia primaria

- Producida por infección viral (inflamación y degeneración neuronal)
- perdida de neuronas inhibitorias, hipertonicidad y falta de relajación del EEI.
- Pérdida del gradiente de latencia en cuerpo por aperistalsis.

Acalasia secundaria

- Producida por neoplasias (esófago, estomago, páncreas pulmón, hígado etc).
- Amiloidosis.
- Chagas.

Diagnostico

- Esofagograma.
- Endoscopia.
- Manometría.

Tratamiento

No tiene cura, pero se busca aliviar los síntomas, mejorar el vaciamiento esofágico y prevenir el desarrollo de mega esófago.

ESOFAGITIS

Inflamación del esófago (ultima parte del estomago).

Causas

- Infiltración de las células inflamatorias (eocinofilos).
- Reflujo gastroesofagico (erosiva y no erosiva).
- Enfermedades sistémicas inmunológicas o reumatológicas.
- Ingesta de algunos medicamentos y líquidos.

Factores

- Hernia hiatal.
- Musculo esfínter débil.
- Consumo excesivo de alcohol, chocolate y cafeína.
- Alimentos grasosos y picantes.
- Fumar.
- Obesidad y/o sobrepeso.
- Acostarse después de comer.

Síntomas

- Dolor y dificultad para deglutir.
- Dolor en el pecho detrás del esternón (se presenta al comer).
- Atoramiento de los alimentos en el esófago.
- Acides.
- Regurgitación.
- Tos.

Diagnostico

- Radiografía con bario.
- Endoscopia.
- Biopsia.

Tratamiento

- Antiácidos.
- Por medicamentos: eliminar o dar otro de manera alternativa.
- Eliminación de alimentos.
- Cirugía.

GASTRITIS

Inflamación aguda o crónica de la mucosa que recubre las paredes del estómago.

Causas

- Fármacos (naproxeno, ibuprofeno o ácido acetilsalicílico).
- Infección bacteriana (H. Pylori).
- Abuso de alcohol y cigarro.
- Alimentos picantes.
- Estrés excesivo.

Síntomas

- Ardor en el estómago.
- Dolor abdominal.
- Nauseas y vómitos (con sangre).
- Acidez en el estómago.
- Aerofagia.
- Ausencia de hambre.
- heces de color negro (cuando hay sangrado interno).

Tipos de gastritis

Aguda: dura algunos días y desaparece cuando el agente causante lo hace (estrés, algunos fármacos y consumo de alcohol).

Crónica: se intensifica con el paso de la enfermedad y esta puede durar meses o años (H. Pylori).

Erosiva: se produce cuando hay una úlcera en el estómago por las debilidades de esta misma (abuso de tabaco y alcohol).

Atrófica: la capa protectora del estómago resulta afectada, incrementando el riesgo de sufrir **cáncer de estómago**.

Diagnostico

- Prueba para el H. Pylori.
- Endoscopia.
- Radiografía con bario.

Tratamiento

- Antibióticos para eliminar el H. Pylori (amoxicilina, claritromicina, metronidazol).
- Medicamentos que bloquean la producción de ácido y promueven la recuperación (omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rebaprazol y dexlansoprazol).
- Medicamentos para disminuir la producción de ácido (antihistamínicos, famotidina, cimetidina y nizatidina).

ULCERA PEPTICA

Heridas que aparecen en el revestimiento del estomago y la parte superior del intestino delgado.

Causas

- Infección bacteriana H. Pylori.
- AINES (ibuprofeno y naproxeno).

Síntomas

- Dolor de estomago ardiente.
- Hinchazón y eructos.
- Intolerancia de los alimentos grasos y/o condimentados.
- Acides estomacal.
- Nauseas.

Complicaciones

- Sangrado interno.
- Perforación en la pared del estomago.
- Obstrucción.
- Cáncer de estomago.

Las úlceras pépticas incluyen:

- Úlceras gástricas: se producen en el interior del estomago.
- Úlceras duodenales: se producen en el interior de la parte superior del intestino delgado.

Diagnostico

- Prueba para el H. Pylori.
- Endoscopia.
- Radiografía con bario.

Tratamiento

- Antibióticos para eliminar el H. Pylori (amoxicilina, claritromicina, metronidazol).
- Medicamentos que bloquean la producción de ácido y promueven la recuperación (omeprazol, lanzoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rebaprazol y dexlansoprazol).
- Medicamentos para disminuir la producción de ácido (antihistamínicos, famotidina, cimetidina y nizatidina).

SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE

Afectación que se crea en el intestino grueso, afectando el movimiento peristáltico.

Causas

- contracción abdominal (puede ser de manera muy rápida o muy lenta).

Síntomas

- Dolor abdominal o cólicos.
- Hinchazón y estrés.
- Exceso de gases.
- Diarrea o estreñimiento (de manera alternada).
- Mucosidad en las heces.

Tratamiento

- Llevar una dieta más saludable.
- Disminución del estrés y medicamentos que irriten.
- Antiespasmódicos para el estreñimiento.
- Mucha fibra.

HEPATITIS

Inflamación del hígado. Producida por un virus, consumo excesivo de alcohol, toxinas, medicamentos o afecciones clínicas.

HEPATITIS A

- se transmite al ingerir alimentos o agua contaminada.
- por contacto con la persona infectada.
- heces infectadas (cambio de pañales).

Síntomas

- fiebre y náuseas.
- vómitos y pérdida del apetito.
- cansancio y dolor en el hígado.
- heces blanquecinas y orina oscura.

Se puede prevenir:

- lavarse las manos.
- cocinar bien los alimentos.
- consumir agua hervida o potable.
- vacunar a los niños a los 12 meses.

HEPATITIS B

- se transmite por el contacto con la sangre.
- por relaciones sexuales.
- de madre a hijo por medio del parto.

Síntomas

- fatiga, náuseas o vómitos.
- fiebre y escalofríos.
- orina oscura, heces blanquecinas.
- ictericia en ojos y piel.
- dolor abdominal en el lado derecho.

Se puede prevenir:

- usar preservativos.
- no compartir agujas u otros elementos punzantes o cortantes.

HEPATITIS C

- por contacto con la sangre,
- relaciones sexuales sin preservativo.
- de madre a hijo por medio del parto.

Síntomas

- falta de apetito y molestias abdominales.
- náuseas y vómitos.
- ictericia en ojos y piel.

Se puede prevenir:

- usar preservativos.
- no compartir agujas u otros elementos punzantes o cortantes.

ETAPAS DEL DAÑO EPATICO

- Inflamación crónica: dolor abdominal y agrandamiento del hígado.
- Fibrosis: tejido cicatrizado.
- Cirrosis: acumulación del tejido cicatrizante en el hígado.
- Cáncer de hígado: formación de tumores.

Bibliografía

<file:///C:/Users/YURENI/Desktop/S1578155010700577.pdf>

<https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/esofagitis>

<https://www.huesped.org.ar/informacion/hepatitis/que-son-las-hepatitis/>