



Nombre de la universidad: UDS (Universidad Del Sureste)

Nombre de la carrera: Licenciatura en enfermería.

Materia: Patología del niño y adolescente.

Nombre del Maestro: Gustavo Armando López Cruz.

Nombre de la alumna: Loyda Eunice Hernández Pérez.

Grado y grupo: 5to Cuatrimestre Semiescolarido.

Lugar y fecha: Tapachula Chiapas – 19 de marzo del 2021.

Cartilla de vacunación

Edad de aplicación	Nombre de la vacuna	Enfermedad que previene	Modo de aplicación y sitio	Cantidad en mililitros de aplicación	Efectos adversos
RN prematuros (2 kg o más)	BCG	Tuberculosis	Vía intradérmica/brazo derecho	0.1 ml	Formación de nódulos en el sitio de aplicación, al mes se puede ulcerar y secretar pus para después cicatrizar. Proceso indoloro con duración de 4 a 8 semanas.
RN 2 meses 6 meses	Hepatitis B (HVB)	Hepatitis B	Vía intramuscular/muslo izquierdo	0.5 ml	Fiebre. *dolor en el brazo donde se aplico.
2 meses 4 meses 6 meses 15-18 meses	Pentavalente acelular	Difteria-tos (DPT) ferina-tétanos (DPaT) Poliomielitis infecciones por influenzae B	Vía intramuscular/muslo derecho	0.5 ml	Fiebre. Inflamación o enrojecimiento donde se aplico la vacuna. Dolor o sensibilidad donde se aplica la vacuna.
4 años	DPT	Difteria-tos ferina-tétanos	Vía intramuscular/Brazo izquierdo	0.5 ml	Dolor o enrojecimiento en el sitio donde se aplico la vacuna (duración 2 a 3 días). Endurecimiento donde se aplico la vacuna. Irritabilidad. Fiebre. Crisis convulsivas asociadas a la fiebre. Ronchas.

2 meses 4 meses 6 meses	Rotavirus (ROT)	Diarrea por rotavirus	Vía oral	Se aplican 2 dosis de Rotarix o 3 dosis de Rotateq por vía oral 1 ml o 2 ml.	Vomito. Diarrea. Fiebre moderada.
2 meses 4 meses 12 meses	Neumococo conjugada	Meningitis neumocócica. Neumonía. Septicemia.	Vía intramuscular	0.5 ml	Irritabilidad. Cansancio. Fiebre o escalofríos. Dolor de cabeza Perdida de apetito. enrojecimiento, hinchazón o dolor donde se aplico la vacuna
6 meses 7 meses anual hasta los 59 años	Influenza (INF)	Influenza	Vía intramuscular/ antero lateral del muslo	0.25 ml 0.5 ml	Dolor, enrojecimiento, hinchazón donde se aplico la vacuna. Dolor de cabeza. Fiebre. Nauseas. Dolor muscular.
1 año 6 años	SRP	Sarampión, rubeola y paperas	Vía subcutánea/brazo izquierdo	0.5 ml	Dolor o enrojecimiento donde se aplico la vacuna. Escurrimiento de nariz. Dolor de cabeza. Tos. Fiebre. Inflamación de las glándulas parótidas.
2 meses 4 meses 6 meses	Sabin	polio	Vía oral	2 a 3 gotas	Dolor de cabeza. Vomito. Diarrea.

4 años					
12 meses 6 años	SR	Sarampión	Vía subcutánea/brazo izquierdo	0.5 ml	Dolor, calor y enrojecimiento en el lugar de aplicación. Fiebre. Inflamación de gangleos. Inflamación leve en articulaciones.
12 meses 6 años	VAR	Varicela	Vía subcutánea muslo o brazo	0.5 ml	Dolor, picor, enrojecimiento donde se aplico. Fiebre. Sarpullido tipo varibeloso.
6 meses 12 meses	Hepatitis A	Hepatitis A	Vía intramuscular	0.5 ml	Dolor, enrojecimiento en la zona de aplicación. Fiebre. Dolor de cabeza.
9 años	VPH	Virus del papiloma humano Cáncer	Vía intramuscular/brazo izquierdo	0.5 ml	Dolor, enrojecimiento e n zona de aplicación. Dolor de cabeza. Congestión nasal. Desmayo. Fiebre. Fatiga. Dolor muscular. Dolor articular.

Bibliografía

<https://www.scielo.sa.cr/pdf/apc/v20n2/a02v20n2.pdf>

<https://www.medigraphic.com/pdfs/infectologia/lip-2019/lip193a.pdf>