

**NOMBRE DEL ALUMNO:**  
**ANGEL RODOLFO JIMÉNEZ DEARA.**

**NOMBRE DEL PROFESOR:**  
**LIC. CRISTIAN DAVID CORTES BERMÚDEZ**

**LICENCIATURA:**  
**CIENCIAS DE LA EDUCACION**

**MATERIA:**  
**COMUNICACIÓN ORAL**

**NOMBRE DEL TRABAJO:**  
**EXPOSICIÓN**

# ¿Cuál es la importancia del aborto?

- \* La relevancia del aborto, es una de la principales **problemas** que generalmente ocurre en la **adolescencia**.
- \* El aborto no solo se da en la **adolescencia** si no también en las **mujeres casadas** (mayores de edad)



# ¿Por qué elegiste el tema?

- \* Es un tema muy importante, me llama mucho la atención, porque en la vida del ser humano existe gran parte de los habitantes que están **a favor o en contra del aborto.**
- \* Porque el aborto **es la pérdida del embarazo, e el que el feto o embrión no es viable.**



# Actualmente ¿El aborto ha aumentado o disminuido los casos?



- \* A mi observación va aumentando los casos.
- \* En las redes sociales, noticias, etc. notifican haber encontrado fetos en distintas partes del lugar y mayormente las mujeres adolescentes se suman a favor del aborto.
- \* A continuación se dará a conocer las características generales del aborto.


# ¿Qué es el aborto?

- \* proceso mediante el cual la gestación de un embrión se ve interrumpida por diferentes causas



- \* Es la pérdida de la gestación de un embrión o feto que tenga menos de medio kilo o 500 gramos o hasta la semana 22

- \* Se finaliza el embarazo de forma abrupta y el feto muere y es expulsado del organismo de la gestante.
- \* El aborto concluye con la expulsión del **feto** a través del canal vaginal.



# Los tipos de aborto

## Aborto espontáneo:

- \* Aquel tipo de aborto o interrupción del embarazo debido a **causas naturales, no siendo voluntario ni provocado.**
- \* Puede deberse a **alteraciones cromosómicas del feto, enfermedades o malformaciones de la madre, infecciones.** La aparición de este tipo de abortos suele ocurrir en las doce primeras semanas.
- \* **3 de cada 10 mujeres que se quedan embarazadas por primera vez sufren un aborto natural,** algo que plantea muchas preguntas y dudas sobre las posibles causas.



# Causas.

- \* Se debe a problemas en los cromosomas de los embriones.
- \* niveles hormonales anómalos, diabetes no controlada, incompetencia del cuello uterino o algunos medicamentos
- \* infecciones, obesidad, problemas físicos en los órganos reproductores de la madre.
- \* La **edad** también puede ser un factor determinante: a mayor edad, mayor es la probabilidad de sufrir un aborto espontáneo, especialmente a partir de los 40 años.



# síntomas.

- \* Lumbalgia, dolor abdominal, cólicos o sangrados vaginales.
- \* distensión abdominal, calambres, náuseas o repulsión a los olores pero, de repente, dejan de tenerlos"



# Aborto fallido o retenido.

- \* Aborto natural en el que por algún motivo el feto en gestación fallece naturalmente.
- \* Permanece en el útero materno durante semanas sin ser expulsado por el cuerpo de la mujer.



- \* La gestante sigue creyendo estar embarazada y tiene los síntomas típicos, pero sin embargo el corazón del gestado ha dejado de latir.
- \* Si el cuerpo no expulsado el feto o no lo hace por completo será necesario intervenir con fármacos o quirúrgicamente.


# Aborto inducido.

Aquel que se realiza por propia **voluntad de la mujer**.  
Hay dos formas de interrumpir un embarazo:

## \* **ABORTO MÉDICO:**

Se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto, Sólo se puede hacer durante las nueve primeras semanas de embarazo. bajo la supervisión de un médico, y pueden surgir algunos sangrados vaginales a causa de los medicamentos

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** cólicos, diarrea o malestar estomacal, y en raras ocasiones, fiebre alta



## \* **ABORTO QUIRÚRGICO:**

Se realiza una cirugía para extraer el feto, por **aspiración con vacío manual**, que se puede hacer durante las 12 primeras semanas de embarazo y consiste en la extracción de todo el tejido que contiene el útero con un instrumento succionador de manera manual y **la dilatación y evacuación**.

# Aborto terapéutico.

- \* Aquel que se realiza bajo el supuesto de que el embarazo supone un riesgo para la salud e incluso la supervivencia de la madre.
- \* También se denominan del mismo modo aquellos abortos que se practican ante la presencia de alteraciones o enfermedades graves del feto que imposibilitan su supervivencia o su desarrollo normativo.

# Aborto legal

- \* Aquel que puede realizarse según la legislación vigente.
- \* sólo podía abortarse de manera legal en los casos de violación, malformaciones severas o riesgo para la vida de la embarazada



# Aborto ilegal

- \* Se trata del conjunto de abortos que se llevan a cabo al margen de la ley, en la clandestinidad.
- \* Este tipo de aborto supone además de un delito un grave riesgo para la salud de la embarazada, debido a que **no se cuenta con ninguna garantía respecto al procedimiento y condiciones de la intervención** a llevar a cabo.

# Aborto precoz

- \* Se refiere a aquella interrupción del embarazo que se produce antes de las doce semanas.

# Aborto tardío

- \* Aquel aborto en el que la interrupción se produce después de las doce semanas de gestación.

## Aborto por medios mecánicos/quirúrgicos

- \* Se refiere al tipo de aborto inducido en que **el método de interrupción es mecánico**, removiendo al feto a través de procedimientos como la aspiración, el raspado o la inyección de sustancias que generan quemaduras al feto y le provocan la muerte.

## Aborto completo

- \* Se entiende como tal aquel aborto en el que se expulsan o son retirados la totalidad de restos biológicos del feto y placenta.

## Aborto incompleto

- \* En el aborto incompleto **parte del feto o de los productos de la gestación permanecen dentro del útero**, quedando restos en el interior.
- \* Puede ser inducido o natural (en este último suele ser más frecuente cuanto más avanzada está la gestación antes de su interrupción).

# Clasificación del aborto

## \* Como proceso:


1. **Síntomas o Amenaza de aborto:** Corresponde a la primera etapa o primeros síntomas o signos de anormalidad de un embarazo. Dolor abdominal tipo contracción uterina.
2. **Aborto en evolución:** Es una etapa más avanzada en la cual los síntomas son más intensos y hay modificaciones anatómicas del cuello del útero que pueden llevar a la salida del contenido uterino, embrión o feto y sus anexos.
3. **Aborto inevitable:** Es el proceso de expulsión del embrión o feto a través del cuello uterino y las acciones corresponden a la atención de la mujer para prevenir complicaciones como hemorragia o infecciones.

## \* la presencia de Infección:


- \* 1. **Aborto séptico:** Es la existencia de infección ya sea antes, durante o después del proceso del aborto. En general los abortos clandestinos son sépticos.
- \* **Aborto Aséptico:** Corresponde a la ausencia de infección. En general corresponde a los abortos espontáneos.

# Como resultado de la expulsión del embrión o feto


- \* **1. Aborto completo:** Es la expulsión de la totalidad del embrión o feto y de los anexos que corresponden a las estructuras de apoyo como la placenta, membranas amnióticas y otras estructuras. La cavidad uterina queda sin ningún contenido.
- \* **2. Aborto incompleto:** En esta condición queda al interior del útero algunas o partes de las estructuras embrionarias fetales o de los anexos. Es necesario vaciar estos contenidos para evitar el riesgo de hemorragias o infecciones y otras complicaciones a más largo plazo.



© Classe Ostl - www.encyclopediasalut.com - V.Barceló




# Según origen del proceso del aborto o de la muerte embrionaria o fetal



\* **1. Espontáneo:** Es la ocurrencia espontánea del proceso de aborto o de la muerte del embrión o feto. No hay intervención de la embarazada o de terceros. Las causas pueden ser otras enfermedades o patologías genéticas incompatibles con la vida o accidentes como una caída o golpe accidental de la embarazada. En general un aborto espontáneo resulta en un proceso sin infección o aséptico

\* **2. Inducido o Provocado o Voluntario:** Existen acciones de la embarazada o de terceros que interrumpen el desarrollo del embrión o feto o que estimulan el proceso de su expulsión del embrión o feto. En general este tipo de abortos tiene consecuencias de infección o procesos sépticos, cuando se efectúa en forma clandestina y sin los cuidados técnicos adecuados. En Chile ha sido y es un gran problema de Salud Pública



# Según la Ley el aborto inducido o provocado o voluntario puede estar permitido o no y se clasifica en:

- \* **1. Aborto Penalizado:** En esta figura legal el proceso de aborto voluntario o la interrupción de la vida embrionaria o fetal está prohibida y su ejecución constituye un delito penado por la sociedad a través de la ley y de los artículos y penalidades del código de Derecho Penal.
- \* **2. Aborto Despenalizado:** En esta condición, la sociedad a través de la ley decide no penalizar la interrupción del embarazo o de la vida embrionaria o fetal. Desde un punto de vista de la filosofía del derecho el aborto, siempre es un hecho negativo y la sociedad decide si constituye causal de pena o no. Algo semejante al homicidio en defensa propia. Si éste ocurre, el homicidio no es legalizado. En las legislaciones acerca del aborto despenalizado existe desde las más limitadas por problemas de salud de la madre en los cuales el no interrumpir el embarazo se pone en riesgo la vida de la madre o por inviabilidad fetal o corta viabilidad neonatal o después de producido el nacimiento, por daños genéticos o embriológicos o por causas sociales delictivas como la violación. Es lo que se entiende por causales Limitadas de aborto despenalizado

# Diferencias entre píldora del día después y píldora abortiva

## \* Píldora del día después

- \* La píldora del día después no puede interrumpir un embarazo en curso ni dañar un embrión en desarrollo.
- \* píldora del día después para evitar un embarazo no planificado son: cuando se han mantenido relaciones sexuales sin protección, olvidos en la toma de la píldora habitual.

## \* píldora abortiva:

- \* Un método de interrupción voluntaria del embarazo .
- \* Las principales contraindicaciones son si la mujer está en tratamiento con corticosteroides, terapia anticoagulante, tiene trastornos hemorrágicos y en los casos de embarazo ectópico (implantación fuera del útero).

# Clasificación del aborto

Tipo	Definición
Temprano	Aborto antes de las 12 semanas de gestación
Tardía	Aborto entre las 12 y las 20 semanas de gestación
Espontáneo	Aborto no inducido
Inducido	Terminación del embarazo por razones médicas o electivas
Tratamiento	Terminación del embarazo porque la vida o la salud de la mujer están en riesgo o porque el feto está muerto o tiene malformaciones incompatibles con la vida
Amenaza de aborto	Sangrado vaginal antes de las 20 semanas de gestación sin dilatación cervical pero con signos de que puede producirse un aborto espontáneo
Inevitable	Sangrado vaginal o rotura de las membranas acompañado de dilatación del cuello
Incompleto	Expulsión de parte de los productos de la concepción
Completo	Expulsión de todos los productos de la concepción
Recurrente o habitual	≥ 2 a 3 abortos espontáneos consecutivos
Retenido	Muerte no detectada de un embrión o un feto que no es expulsado y que no produce sangrado (también llamado huevo muerto y retenido, feto muerto, embarazo anembrionado o pérdida embrionaria intrauterina)
Séptico	Infección grave de los contenidos uterinos durante o poco antes o después de un aborto

# Referencias bibliográficas:

- \* Pérez D, Planto A. (1995). Factores Epidemiológicos asociados al aborto. Ginecología y Obstetricia.
- \* Pinto A, Gabiatti Y, Motta M, Paiva L, Vergilio M, Silva J. (1991). Algunas características del aborto en la adolescencia.
- \* Schor N, López F. (1990). Adolescencia y anticoncepción: estudio del conocimiento y uso en puérperas internas por parto o aborto. Rev. saude Pública.
- \* Programa de educación sexual CESOLAA, curso de educación sexual on line de auto aprendizaje.