



MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Universidad del sureste

CORTE DE COLA EN OVINOS

ODALYS BELTRÁN ZUARTH

Corte de cola

Cuando se realiza por alguna razón en particular (ej. distinción de género o prevención de acumulación de cascarria) el corte debe realizarse a partir de la

tercera articulación palpable en ambos sexos y no más corta (suficientemente larga como para cubrir la vulva en hembras).

Se recomienda que el descole sea realizado lo más temprano posible entre las 24 horas después del nacimiento del cordero (luego que se establezca el vínculo madre-hijo) y las 8 semanas de vida del mismo. Cuanto antes se realice dentro de este período, menor será el dolor y el estrés ocasionado, lo que resulta en una herida menor y en una mejor cicatrización. Se recomienda utilizar como referencia la edad promedio de los corderos en una majada. Cuando por algún motivo el procedimiento es realizado después de las ocho semanas de vida el dolor debe ser evitado; por ejemplo en corderas de pariciones tardías al siguiente otoño para evitar la miasis. Para esto se debe solicitar asistencia técnica de un veterinario con la recomendación que los métodos alternativos para el descole sean discutidos y revisados en forma regular. Como métodos, se sugiere utilizar anillos de goma o la termo cauterización para el descole, preferentemente al cuchillo o a otros métodos cortantes.

Se recomienda que, inmediatamente luego del procedimiento, los corderos vuelvan a la pastura o a un brete limpio y seco, junto a sus madres. Se recomienda minimizar las posibilidades de infección a través de la vacunación de las ovejas y corderos y también evitando el trabajo en zonas barrosas o polvorientas, o durante períodos de lluvia o humedad. Debería cuidarse meticulosamente la limpieza de las instalaciones, de las manos del operario y del equipo o herramientas utilizadas cuando se realiza el descole.

Se deberían tomar precauciones para prevenir y reducir el riesgo de incidencia de la mosca de la bichera.

se debe recorrer la piel hacia el nacimiento de la cola para permitir un buen cierre y cicatrización, dejando la cola con un largo suficiente como para cubrir la vulva en el caso de las corderas o el ano en el caso de los corderos. Luego, se recomienda cauterizar las venas y arterias coccígeas con un cautín, para luego aplicar tintura de yodo

Lidocaina, tetracaína, procaína por infiltración en la línea de incisión.
suturas superficiales