Nombre de alumnos: ANA CRISTINA HENANDEZ JIMENEZ

Nombre del profesor: MAHONRRY DE JESUS RUIZ

Nombre del trabajo: MAPA CONCEPTUAL

Materia: ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA I

Grado: 5to

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de marzo 2021.

PRIMEROS AUXULIOS SEGÚN EL TIPO DE HERIDA

HERIDAS LEVES

Ejemplos

Si la herida es en la mano, procura inmediatamente quitar anillos, pulseras u otros objetos que pueda obstruir la circulación sanguínea.

Lávate las manos con agua y jabón, antes de iniciar los primeros auxilios.

Limpia la herida con agua limpia y jabón, después con un desinfectante, limpia los extremos cercanos a la herida, evita que el desinfectante entre en la herida.

Evita poner pomadas o polvos antibióticos

Si la herida no sangra la puedes dejar descubierta, siempre y cuando no sea expuesta a factores infecciosos. También cubrir la herida con una gasa estéril etc.

Cambia la gasa diariamente, observa si la piel presenta inflamación, enrojecimiento o dolor. Si este es el caso, comunícate con tu médico para que te recete el medicamento adecuado.

HERIDAS GRAVES

Ejemplos

Por lo general una herida grave requiere de atención médica urgente, tata de localizar ayuda médica de inmediato y prosigue con los primeros auxilios.

Procura guardar la calma ante el herido

Lo primero que debes hacer es evaluar el tipo de herida

Tomar signos vitales

Tratar de detener

Tratar detener la hemorragia y prevenir el estado de shock.

Cuando la herida fue causadas por un cuchillo, picahielos, etc. Y el objeto aun esta clavado en el cuerpo, por ni8ngun motivo lo saques, de4bes tratar que el objeto se mueva lo menos posible, puedes improvisar una especie de dona con tela o gasas y fijarla a la piel.

No debes de beber nada a la víctima.

HERIDA POR ARMA DE FUEGO

La dirección

Que tomo la bala dentro del cuerpo es impredecible a simple vista, ´pero siempre hay que pensar en órganos dañados, fractura de huesos, etc.

Las heridas de bala deben ser atendidas de inmediato por un profesional médico.

Revisa el lugar de la herida y procura detener el sangredo con un trapo, gasa limpia

Acuesta a la víctima de espaldas con las piernas recogidas (flexionadas), colocando cojines debajo de las rodillas.

Toma signos vitales, evita estado de shock,

Mantén a la víctima acostada y cubierta con una manta, mientras llega la ayuda médica profesional.

No des de beber nada

Si la herida es un una extremidad (brazo, pierna) cubre la herida, entablilla y traslada al herido a un centro médico.

HERIDAS DE CARA Y CRANEO

Estas

Heridas son causadas por un golpe, caída, un accidente automovilista; este tipo de heridas, por lo general, sangran mucho debido a la vascularización de la zona.

La

Victima puede manifestar tener visión doble, presentar vómito, cosquilleo, adormecimiento o parálisis de la cara.

Procurar recostar a la víctima y tranquilizarla.

Limpia la herida con una gasa y agua limpia o suero fisiológico, no uses desinfectantes.

Cubre la herida con una gasa, o tela evita ejercer presión sobre la herida, ya que puede haber fractura con hundimiento del hueso.

Procurar mover lo menos posible la víctima, para evitar mayores lesiones en caso de fractura de cráneo o cuello

Cuando la herida está en un ojo o en ambos, no trates de quitar el objeto clavado, simplemente cubre los ojos con un vaso desechable o algo similar y trata de fijarlo con una venda, y busca ayuda médica profesional de inmediato.

HERIDA POR ANZUELO

En este

Tipo de heridas, lo indicado es observar la profundidad del anzuelo.

Nunca trates de jalar el anzuelo.

Simla punta salió por otro extremo, lo conveniente es cortar el extremo puntiagudo con unas pinzas o alicatas limpias, y retirar el anzuelo por el lugar por donde entro. Si puedes cortar ambos extremos del anzuelo, lo puedes sacra por cualquier de los lados.

Lava y desinfecta la herida.

Si la herida fue muy profunda y sangre mucho, busca ayuda médica profesional.

LEVANTAMIENTO DE PIEL

En este tipo

De heridas, se ve claramente, una porción de la levantada.

No laves la herida

Intenta colocar la piel nuevamente en su lugar, cubre la herida con gasa.

Si el sangrado es importante, puedes aplicar un poco de presión con una vendas ancha.

Aplica frio local y busca ayuda médica profesional, tal vez sea necesario poner algunos puntos de satura para cerrar la herida.

APLASTAMIENTO

Ejemplos

Procura, con ayuda de otra persona tratar de retirar el peso lo más rápido posible.

En este tipo de emergencias es de suma importancia el tiempo que la víctima estuvo aplastada, toma el tiempo de la hora del accidente (si te es posible), y la hora en la que retiraron el peso.

Controla las hemorragias graves y cúbrelas con un trapo limpio.

En caso de haber fracturas procura inmovilizar la zona o completamente a la víctima.

Tome signos vitales y procura que la víctima no caiga en shock

COMPLICACIONES

Se llama

Hemorragia a la salida de la sangre de los vasos que la conducen.

Las hemorragias

Un su mayor parte, son de origen traumático, se pueden presentar hemorragias de tipo no traumático

Llegan a producir roturas vasculares (tumores, ulceras de estómago, varices, enfermedades infecciosas, etc.

Las hemorragias se dividen de acuerdo con los vasos lesionados en:

Hemorragia capilar

Se produce

Cuando la incisión afecte los tejidos y secciona los vasos de pequeño diámetro, tanto arteriales como venosos.

En estos casos

La sangre brota de los bordes de la herida, llamándose hemorragia en sabana.

Hemorragia arterial

Se produce

Al lesionarse arterias de mediano o grueso calibra, entonces la sangre sale de color rojo intenso en chorros intermitentes etc.

Hemorragias externas, internas y subcutáneas

Se produce

(Debajo de la piel).

SINTOMAS DE UNA HEMMORRAGIA

El síntoma

Más visible de la hemorragia s la propis pérdida de sangre.

En las hemorragias exteriores muy profundas o en las internas pueden presentarse alteraciones generales muy particulares, como el cuadro clínico del llamado shock hemorrágico.

Se **presenta**

Palidez de la piel, la cual esta a su vez fría, la mucosa de los labios blanquecinas, pulso rápido, etc.

Si la hemorragia continua llega el sincope cardiaco y muerte.

Este estado es el

Llamado shock hemorrágico.

Si la hemorragia puede contenerse y empezar el tratamiento adecuado, según se indicara, e4l herido va recuperándose lentamente, según el grado de anemia por la sangre perdida

PRIMEROS AUXILIOS EN CAOS DE HEMORRAGIA

Acostar al herido, colocar la cabeza más baja que los pies,. La quietud de la parte herida ayuda a formar un coagulo.

Evitar el enfriamiento del accidentado, así evitar cualquier compresión del cuerpo, aflojando el cuello, el cinturón o toda ligadura.

Detener la hemorragia. En las hemorragias externas es fácil realizar maniobras para detener la hemorragia, dentro de las normas siguientes

Utilizar un medio más seguro y que menos consecuencias o complicaciones pueden dejar, lo mejor es una compresión manual adecuada, en la raíz del vaso etc.

si se usa hemostasia mecánica con torniquete, anotar cuidadosamente y en un sitio bien visible, la hora en que ha sido colocada