Nombre de alumnos: FERNANDO NAJERA GUILLEN

Nombre del profesor:

Nombre del trabajo: MAPA CONSEPTUAL

Materia: ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA I

Grado: 5TO CUATRIMESTRE

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de MARZO DE 2021.


Primeros Auxilios según el tipo de herida
Heridas de cara y cráneo
Herida por anzuelo
Levantamiento de piel
Aplastamiento
Herida por arma de fuego
Es probocada por una arma de fuego y troduciendo una vala al cuerpo.
Por lo que sedebe
ser atendidas de inmediato por un profesional médico
Checar sino hay huesos dañados o organos
Revisar el lugar de donde fue la h erida
Tomar signos vitales
Evitar ponerla en shock
Estavilar bien la erida
Heridas graves
son
aquellas que reúnen uno o más factores de gravedad
Por lo general
requiere de atención médica urgente
Primeros auxilios
Evaluar el tipo de erida
Tomar signos vitales
Tratar de detener la hemorragia y prevenir el estado de shock
Cubrir la erida congasas esterilizadas
No des de beber nada a la
Heridas leves
SON
los pequeños cortes o erosiones superficiales que no están contaminados o infectados
CAUSADAS
por objetos puntiagudos
COMO
agujas, clavos, ganchos, picahielos o desarmadores que penetran la piel.
Si la herida es en la mano.
Pasos aseguir
Quitarce todos los objetos que se tengan en la mano
Limpia la herida con agua limpia y jabón.
con un desinfectante, limpia los extremos cercanos a la herida
Cubrir congas y cambiarlas diariamente
Complicaciones
Son
Llamadas hemorragias
en su mayor parte, son de origen traumático, sin embargo, se pueden presentar hemorragias de tipo no traumático en el curso de algunas enfermedade
Se dividen
Hemorragia capilar
se produce cuando la incisión afecta los tejidos y secciona los vasos de pequeño diámetro
Hemorragia arterial
se produce al lesionarse arterias de mediano o grueso calibre
Hemorragias externas, internas y subcutáneas
(debajo de la piel).
Síntomas de una hemorragia
El síntoma más visible de la hemorragia es la propia pérdida de sangre.
pueden presentarse alteraciones generales muy particulares
como
shock hemorrágico.
Se presenta
respiración lenta y superficial
mucosa de los labios blanquecinas
pulso rápido, pero de un latido muy débil
Primeros auxilios en casos de hemorragias
Acostar al herido, colocar la cabeza más baja que los pies
Evitar el enfriamiento del accidentado
Si la herida es en un miembro, elevar ese miembro
Detener la hemorragia
Utilizar el medio más seguro y que menos consecuencias o complicaciones puede dejar
Si se usa hemostasia mecánica con torniquete, anotar cuidadosamente y en sitio bien visible, la hora en que ha sido
Primeros auxilios
Lo pricipal es ayudar aretirar el peso los mas rapido pocible.
Controla las hemorragias graves y cúbrelas con un trapo limpio
En caso de haber fracturas procura inmovilizar la zona o completamente a la víctima
Tomar signos y sintomas
Por muchos accidentes cuando cuando caen objetos pesado sobre la persona
causada
Por caidas o cortadas
causada
Primeros auxilios
Intenta colocar la piel nuevamente en su lugar
aplicar un poco de presión con una venda ancha
tal vez sea necesario poner algunos puntos de sutura para cerrar la herida.
En este tipo de heridas, se ve claramente, una porción de la piel levantada.
En este tipo de heridas, lo indicado es observar la profundidad del anzuelo.
Por lo que
Nunca devemos de jalar el anzuelo
Ya que
Si la punta salió por otro extremo
No lavar herida
lo conveniente es cortar el extremo puntiagudo con unas pinzas
retirar el anzuelo por el lugar por donde entró
finalmente
Lavar y desinfecta la herida
Para evitar leciones
Procura mover lo menos posible a la víctima
Limpiar la herida con una gasa y agua limpia o suero fisiológico
evita ejercer presión sobre la herida
Procura recostar a la víctima y tranquilizarla.
hemorragia por oídos y nariz.
precenta
Este tipo de erida sangran mucho debido a la vascularización de la zona.
Por lo general
causadas por un golpe, una caída, un accidente automovilista
son