



Nombre de alumnos: ANA CRISTINA HERNANDEZ JIMENNEZ

Nombre del profesor: MARCOS JHONADY ARGUELLO GALVEZ

Nombre del trabajo: MAPA CONCEPTUAL

Materia: PATOLOGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Grado: 5to

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 de febrero de 2021.

ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

TOS FERINA

Enfermedad

Bacteriana altamente contagiosa que ocasiona una tos violenta e incontrolable que puede dificultar la respiración

Epidemiología

Se relaciona con

Bordetella pertussi, B parapertussi, B bronchiseptica, B holmessi y B hinzii

Clínica

Se presenta una clínica bien definida en 3 fases

Fase catarral

Se presentan síntomas

DIFTERIA

Enfermedad

Infecciosa producida por una bacteria

Afecta a las

Vías respiratorias, la piel, y puede no producir ni un síntoma

Se presentan en

Difteria respiratoria

Difteria cutánea

Diagnostico

Se basa en sintomatología requiere un cultivo de bacteria muestras del faringe o de la nariz

Tratamiento

Administración de antitoxina difteria y antibióticos

TETANOS

Enfermedad

Aguda y grave inducida por una exotoxina del bacilo tetánico

Vías de entrada son

Heridas contaminadas

Causante de los tétanos

Microorganismos *costridium tétano*, bacilo esporulado y anaerobio estricto de forma típica de "palillo de tambor"

No existe transmisión de

Persona a persona

Periodo de incubación

POLIOMIELITIS

Enfermedad

Caracterizada por una parálisis flácida asimétrica

Causada

Por los tres serotipos del virus de la poliomielitis

No existe un tratamiento médico eficaz

Solo

Medidas preventivas como la vacunación

Periodo de incubación tras la vacunación

4-24 días en el niño vacunado

11-58 días en los contactos

ESCARLATINA

Enfermedad exantemática

Infectocontagiosa

Transmisión por

Persona a persona al estornudar, puede ser por enfermos o por portadores sanos

Diagnóstico clínico

Factores de riesgos

Zonas urbanas, infecciones faríngeas, heridas o quemaduras, contacto con personas infectadas, hombres y mujeres, cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal, mialgias, malestar general etc.

Hasta 8 meses en los inmunodeprimidos

Signos

SARAMPION

Enfermedad

Muy contagiosa y grave

Causada

Por virus

Se transmite por

Contagio directo y del aire

Manifestaciones clínicas

Fiebre alta, rinorrea, tos, ojos llorosos, y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

Tratamiento

No existe un tratamiento antiviral contra este virus

Se puede evitar con un tratamiento de

VARICELA

Enfermedad

Exantemática infantil muy contagiosa producida por el mismo virus

Con el periodo de incubación es

14 a 16 días (intervalo de 11 a 21 días)

Se transmite

Por persona a persona a través del contacto directo, lesiones

Complicaciones frecuentes

Cutáneas, neurologías (1/1000 casos) respiratorias, y hematológicas y entre otras

Diagnostico



