



**NOMBRE DEL ALUMNO: Yoana Itzel Gutiérrez
Álvarez**

**NOMBRE DEL PROFESOR: Lubdi Isabel Ortiz
Pérez**

LICENCIATURA: Enfermería

MATERIA: Enfermería del niño y adolescente

**CUATRIMESTRE Y MODALIDAD: 5° cuatrimestre
escolarizado**

**NOMBRE Y TEMA DEL TRABAJO: Mapa
conceptual de sexualidad y conductas en la
adolescencia**

SEXUALIDAD Y CONDUCTAS DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA

Adolescencia

Se define como la «edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo»

Organización Mundial de la Salud

La adolescencia transcurre entre los 10 y 19 años

Descubriendo

La identidad, maduración sexual,

En 2009 la población

15 a 24 años sufrió aproximadamente el 40% de los casos de infecciones nuevas por VIH

Los jóvenes

El 36% de los hombres y el 24% de las mujeres tienen conocimientos amplios y correctos para protegerse contra el virus

Prácticas sexuales

Se sitúa entre 14,15 y 15,28 años.

Iniciación temprana

Es una mayor exposición a los riesgos por carecer a esas edades de suficiente información y de habilidades para la gestión responsable de los mismos

Los chicos

Inician primero en las prácticas sexuales, no se observan diferencias significativas en el porcentaje de chicos y chicas que informan haber tenido relaciones completas antes de los 16 años de edad.

Situándose

En el 34,6% de este grupo de población

Los hombres

Se dividen entre la pareja estable y una pareja ocasional o desconocida.

Las chicas

Afirman haberlo hecho con su pareja estable en un 69,6 %.

LAS DROGAS EN LA ADOLESCENCIA

La drogadicción

Es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo o incontrolable de la droga.

Cambios en el cerebro

Pueden generar las conductas dañinas que se observan en las personas que se drogan.

La adicción

Afecta las zonas del cerebro que participan en la motivación y la recompensa, el aprendizaje, la memoria y el control del comportamiento

Tratamiento para la drogadicción

- orientación conductual
- medicación
- aplicaciones y dispositivos médicos que se usan para tratar los síntomas de abstinencia
- evaluación y tratamiento de problemas concurrentes de salud mental, como la depresión y la ansiedad

Servicios asistenciales

En un programa personalizado de tratamiento y tener opciones para el seguimiento pueden ser cruciales para el éxito del programa

Tratamiento

Debe incluir servicios médicos y de salud mental

La desintoxicación

No es por sí misma "tratamiento", es solo el primer paso del proceso. Los pacientes que no reciben ningún tratamiento después de la desintoxicación por lo general vuelven a consumir drogas

La adicción a los estimulante: (cocaína, metanfetamina) y al cannabis (marihuana).

Opioides

(Dolophine, Methadose, la buprenorfina (Suboxone, Subutex, Probuphine, Sublocade

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

