

NOMBRE DEL ALUMNO:

Elizabeth Guadalupe Espinosa López

NOMBRE DEL PROFESOR:

Lic. Ludbi Isabel Ortiz Perez

LICENCIATURA:

Licenciatura en Enfermería

MATERIA:

Enfermería del niño y el adolescente

CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

5to. Cuatrimestre Enfermería, Escolarizado

NOMBRE Y TEMA DEL TRABAJO:

Ensayo, tema:

“Factores de riesgo”

FACTORES DE RIESGO

Drogas en la adolescencia

Se

Caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo o incontrolable de la droga a pesar de las consecuencias perjudiciales que acarrea y los cambios que causa en el cerebro, los cuales pueden ser duraderos

Tratamiento

Son

- Orientación conductual
- Medicación
- Aplicaciones y dispositivos médicos para tratar la abstinencia
- Evaluación y tratamiento de problemas
- Seguimiento a largo plazo para evitar la recaída

Tratamiento para adicción grave

Como

Opioides

se usan

Metadona (Dolophine®, Methadose®),
Buprenorfina (Suboxone®, Subutex®,
Probuphine®, Sublocade™)
Naltrexona (Vivitrol®)

Tabaco

Parches, aerosoles,
goma de mascar y pastillas.

Alcohol

- Naltrexona: bloquea los receptores opioides
- Acamprosato (Campral®): puede reducir los síntomas de abstinencia duradera
- Disulfiram (Antabuse®): interfiere con la descomposición del alcohol

Vigilancia epidemiológica

Es

La recolección y análisis de los datos registrados en forma sistemática convertidos en información integrada

Permite

Conocer la distribución de los factores que afectan directa o indirectamente la salud de la población, identificando precozmente los hechos que impliquen un riesgo para la salud pública

Vigilancia sindromica

Es

agrupa a una serie de enfermedades con manifestaciones clínicas dentro del periodo prodromico de similares características

3 estrategias

Son

unidades

Unidades centinelas

Medicos

Sexualidad y conducta de riesgo en la adolescencia

Es

Etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. Diferencia en ella dos periodos: la adolescencia temprana, de 10 a 14 años, y la tardía, de 15 a 19 años

Sexualidad se inicia

entre 14,15 y 15,28 años.

Riesgos

En 2009 el 40% de los casos de infecciones nuevas por VIH

Hombros

Son los primeros en iniciar su vida sexual