

UNIDAD 3

Enfermedades equinas

Sarnas , Fungosis , Píddermatitis , Habronemiasis , Escaras , Vermes , Consumo de arena 3.8. Ingestión de astillas de aserrín

Sarcoide equino: se ha asociado fuertemente con infecciones por papilomavirus bovino . El papilomavirus bovino es el papilomavirus . Los papilomavirus son estrictamente específicos de cada especie, incluso en condiciones experimentales

Dermatomicosis: Enfermedad infectocontagiosa. Son susceptibles muchas especies animales y el humano. Es estacional, con un periodo de incubación de 1 a 4 semanas. Es una zoonosis

Estomatitis vesicular equina.: Enfermedad infectocontagiosa. Afecta las comisuras labiales, la lengua y los ollares. Son susceptibles los equinos, rumiantes, porcinos y humanos. Es estacional, con un periodo de incubación de 2-4 días. Es una zoonosis.

Consumo de arena La acumulación de arena :en el tracto intestinal del caballo puede causar una variedad de signos clínicos.

Retenciones de arena son comunes en caballos y ponis con acceso a suelos arenosos, especialmente si son alimentados con grano o heno suplementado de la tierraDiagnósticos

Ingestión de astillas de aserrín : Es conducta de comportamiento redirigido, de tipo oral que se da como consecuencia de mantener al caballo en pesebrera con raciones controladas con poca fibra y es debido a este hábito que el caballo redirige esta conducta al material de la cama



étanos El Tétanos es una enfermedad toxiinfecciosa, de curso agudo y muchas veces mortal. Afecta a numerosas especies animales, siendo muy susceptibles los ovinos, equinos y humanos. En los potrillos recién nacidos, el bacilo del Tétanos penetra generalmente por el cordón umbilical. Los esporos del agente se encuentran en suelos contaminados con estiércol seco.,

Nombre del trabajo: super nota

Materia: Equinos

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5

grupo : U

**Nombre del estudiante : jose andres
pinto**