



Nombre del alumno:


Tadeo Alejandro Abadia Cancino

Docente:

MVZ. Lucia Guadalupe Gonzales

Materia:

Patología y técnicas quirúrgicas de pequeñas especies



PARVOVIRUS

Es una infección causada por un virus, es sumamente contagioso, afecto principalmente el tracto gastrointestinal en los perros adultos, cachorros y otros cánidos salvajes

AGENTE ETIOLOGICO

Vc-2 es un virus de ADN de cadena sencilla, no envuelto, tiene un diámetro de 25 nm, con un genoma de alrededor de 5000 nucleótidos, posee tres genovariantes

TRANSMICION

La transmisión ocurre por la vía fecal-oral, después de la exposición al virus en las heces o vómito, o el virus que persiste en fómite.

SINOLOGIA

La sinología clínica de parvovirus canino se ha descrito desde su aparición, y se menciona comúnmente que en los cuadros clínicos típicos

DIAGNOSTICO

Se debe sospecharse parvovirus en los perros jóvenes con una aparición súbita de vómito y diarrea, sobre todo si están deprimidos, febriles o tienen leucopenia, o si han estado en contacto con perros infectados

TRATAMIENTO

Terapia de sostén, no existe aún antivirales, se pueden usar terapias alternativas.