



NOMBRE DEL ALUMNO

TADEO ALEJANDRO ABADIA CANCINO

DOCENTE

MVZ. LUCIA GUADALUPE GONZALEZ

MATERIA

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE PEQUEÑAS ESPECIES

OPERACIÓN CESAREA

Anestesia	Se inyecta el anestésico lentamente; el difusible tejido celuloadiposo, de grandes mallas, que ocupa el espacio epidural, no opone resistencia a la penetración de la solución anestésica, cuya dosis aproximada en caninos es de 0.5 ml por kg de peso y de 0.1 en felinos
Primer tiempo	laparotomía media umbilico púbica (que comprenda 2.5 cm adelante de la cicatriz umbilical, y hacia atrás hasta el pubis). Para esta laparotomía, ver la técnica de histerectomía
Segundo tiempo	se procede a hacer una incisión. De acuerdo con el tamaño de los fetos, en la bifurcación de los cuernos en su unión con el cuerpo del útero; si los ligamentos anchcs lo permiten, levantar ios cuernos y llevarlos hacia atrás para hacer ia incisión en la parte dorsal; si esto no es posible, hacerla en la ventral.
Tercer tiempo	sacar de inmediato el feto más próximo junto con sus envolturas y entregarlo al ajrdante, el cual deberá romper las envolturas placentarias para favorecer de inmediato la respiración y cortar el cordón umbilical en medio de dos pinzas kelly
Cuarto tiempo	Cuarto tiempo: en seguida el cirujano hace presión moderada con ambas manos, primero en un cuerno y luego en el otro, para acercar los fetos a la herida uterina y extraerlos.
Quinto tiempo	terminada la extracción de los fetos y sus placentas, se limpian los labios de la herida uterina con una compresa húmeda, y se hace hemostasia por ligadura de los vasos que aún sangren, y se espolvorea con sulfatiazol estéril.
Sexto tiempo	La sutura de connell, se inicia sutura de cushing, que comprende solamente serosa y muscular,
Séptimo tiempo	se lavan los cuernos con solución fisiológica tibia y se regresan a la cavidad abdominal, iniciándose el cierre de la pared, según la técnica descrita para histerectomía
Octavo tiempo	se cubre la herida con gasa impregnada en colodión elástico, si los cachorros requieren ser alimentados por la madre; en caso contrario, puede ponerse un apósito de gasa sostenido con tela adhesiva en forma circular alrededor del vientre.