Nombre de alumno: Samuel Jimenez Hernandez

Nombre del profesor: Lucia Guadalupe Gonzales

Nombre del trabajo: Cuadro Sinoptico

Materia: PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE PEQUEÑAS ESPECIES

1.

Grado: 5 Grupo: a

Comitán de Domínguez Chiapas a 07 de abril 2021

Cesaria

- Operación cesárea en caninos y felino
  - debe haber consideraciones sobre anestesia
    - siempre se debe de emplear anestésico que cumpla sus funciones de mantener a la madre con la falta de sensibilidad y movilidad
      - podrán emplearse si se comprueba que los fetos han muerto
- Las precauciones
  - extraer los fetos del útero lo más rápido posible, desprenderles de inmediato
    - Las envolturas placentarias, limpiar o absorber los líquidos de las caudales nasal y bucal
      - Se suministrará oxígeno en caso que los cachorros no tengan la vitalidad normal
- Técnica
  - previo depilado de la región lumbosacro
    - se hace antisepsia
      - Posteriormente poner al paciente se penetre aguja espacio lumbosacro
        - es importante considerar la dosis adecuada a cada paciente ya que una sobredosis puede ocacionar accidentes
- Primer tiempo
  - la parotomía media umbilical púbica
    - Que comprenda 2.5 cm adelante de la cicatriz umbilical, y hacia atrás hasta el pubis
      - Se puede apreciar uno o ambos cuernos, y hacia atrás su unión con el cuerpo del
- Segundo tiempo
  - se procede a hacer una incisión
    - De acuerdo con el tamaño de los fetos
      - se hace en la parte dorsal
- tercer tiempo
  - Sacar de inmediato el feto
    - Deberá romper las envolturas placentarias para favorecer de inmediato la respiración
      - cortar el cordón umbilical en medio de dos pinzas kelly
- cuarto tiempo
  - El cirujano hace presión moderada con ambas manos primero en un cuerno y luego en el otro
    - en caso no ialiera
      - se introducirán por la herida las pinzas de anillos o el fórceps,
- quinto tiempo
  - terminada la extracción de los fetos y sus placentas
    - Se limpian los labios de la herida uterina
      - se hace hemostasia por ligadura de los vasos que aún sangren
- Sexto tiempo
  - terminada la sutura de connell
    - se inicia sutura de cushing, que comprende solamente serosa y musculosa
      - se inicia una involución rápida del utero
- séptimo tiempo
  - se lavan los cuernos con solución fisiológica tibia
    - Se regresan a la cavidad abdominal iniciándose el cierre de la pared
- octavo tiempo
  - Se cubre la herida con gasa impregnada en colodión elástico
    - si los cachorros requieren ser alimentados por la madre
      - puede ponerse un aposito de gasa con tela adesiva en forma circular del vientre