



**Nombre de la alumna: Santiago
Osorio Ingris Johana.**

**Nombre del profesor: Lucia
Guadalupe Gonzales**

**Nombre del trabajo: cuadro
sinóptico**

**Materia: Técnicas quirúrgicas en
pequeñas especies**

Grado: 5to cuatrimestre

Grupo: A

Unidad IV

CIRUGÍA ESTÉTICA, CAUDAL Y AURICULAR

Amputación del pabellón de la oreja

Se da un algunas razas de perros, cuyos estándares o patrones de perfección establece que se les debe amputar

Esta técnica se realiza en cachorros de 3 a 4 meses de edad

CESARIA

se practica en hembras de diferentes especies, como un recurso terapéutico cuando se presenta distocia, o sea que en el momento del parto los fetos no pueden salir normalmente

REDUCCIÓN DE FRACTURAS

o para realizar un examen físico completo incluye un fonendoscopio, una linterna de punto, un martillo de percusión o similar, y agujas y/o catéteres estériles y jeringas

OVARIOHISTERECTOMIA

están situados a nivel de la cicatriz umbilical, en el extremo anterior de ambos cuernos uterinos, y suspendidos en la cavidad abdominal a la altura del polo posterior de los riñones.

REDUCCIÓN E PROLAPSO VAGINAL Y ANAL

El prolapso del útero se presenta cuando el cuerno gestante se evierte después del nacimiento del feto

Etiología y patogénesis

se inicia con la intususcepción del cuerno grávido en la extremidad del ovario

En mayoría de los casos se encuentra en decúbito y el órgano prolapsado está desparramado sobre la tierra

