

TITULO: Mapa conceptual



- **Materia:** Fundamentos de fauna silvestre
 - **Docente:** Sarain Gumeta
 - **Licenciatura:** Medicina Veterinaria y Zootecnia
 - **Cuatrimestre** 8°
 - **Nombre del alumno:** Ana María Aguilar Velasco
- 

Principales patológicas de fauna silvestre y técnicas quirúrgicas especiales

Enfermedades de los anfibios y los reptiles

Los mas

Frecuente son en vías respiratorias altas y bajas

Bacterianas

Tortugas

Signos

- Secreción nasal
- Rinitis
- Sinusitis
- Disnea
- Sonidos anormales
- Natación dispareja
- Consolidación pulmonar - Neoplasia
- Inflamación

Tratamiento

Tratamiento

Antibacterianos
Ceftiofur
Ciprofloxacina
Enrofloxacin
Gentamicina
Oxitetraciclina

Ofidios

Signos

Disnea
Frecuencia respiratoria aumentada
Extensión del cuello
Descarga nasal
Depresión
Letargia.

Tratamiento

Serpientes

Signos

Emaciación
Falta de apetito
Piel hiperémica y edematosa
Anemia
Formación de abscesos

Parasitarias

Lagarto

Signos

Anemia
Dermatitis
Necrosis
Abscesos subcutáneos

Tratamiento

Remoción manual
Aplicar piretroides

Tortugas

Signos

Dermatitis
Necrosis
Abscesos subcutáneos

Tratamiento

Remoción manual
fipronil®, aplicar tópicamente con una gasa
Aplicar piretroides con una gasa y dejarla por 15 minutos
NO aplicar ivermectina

Fungales

Saurios

Signos

Respiración con la boca abierta
Secreción ocular y nasal
Abscesos bacterianos en cavidad oral

Tratamiento

Ketoconazol 15-30 mg/kg vo cada 24 horas durante 14-28 días
Nistatina 100.000 ui/kg vo cada 24 horas durante 10 días

Principales patológicas de fauna silvestre y técnicas quirúrgicas especiales

Enfermedades de las aves

Parasitarias

Síndrome de mutilación o picaje

Es la

Costumbre de arrancarse las plumas, dejando áreas de piel completamente desnudas

Causas

Son

Virales, micóticas, microbianas, desórdenes endocrinos o nutricionales, por parásitos, alergias, por factores medioambientales o conductuales

Trichomona gallinae

Signos

Pérdida del apetito
Enflaquecimiento
Dificultad respiratoria
Presencia de líquido maloliente en cavidad bucal
Fluido grisáceo
Nódulos caseosos blanco amarillentos

Tratamiento

Metronidazol 10-30 mg/kg vo,
administrar por 6-7

Áscaris

Signos

Diarreas
Plumaje erizado
Mucosas pálidas
Estreñimiento
Muerte a los 8 días

Diagnostico

Detección de huevos
método de flotación

Eimeria spp

Signos

Pluma erizada
Mucosas pálidas
Inapetencia
Pérdida de peso
Diarrea sanguinolenta

Diagnostico

Identificación microscópica de los ooquistes en las heces