



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre de alumno: Francisco Jiménez López

Nombre del profesor: ing. Gabriela Villafuerte Aguilar

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: ginecología y obstetricia

Grado: 8to Cuatrimestre

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: "A"

**Lesiones
Consecutivas
Al parto**

**Del canal
Del parto**

Laceraciones son las laceraciones que pasa en el parto la cual provoca hemorragia de pequeños vasos en el recto del animal también esto se puede infectar si Esto pasa en animales hay que tratarlo inmediatamente Si pasa ms del tiempo hay que esperar que la Protuberancia baja o también colocarles una pinzas Hemostáticas en donde haya hemorragias

**Laceraciones de
Canal del parto**

La retención parcial es más común y frecuentemente la frecuencia de placenta retenida es de 7 a 10% la distocias, extracciones forzadas aumentan la incidencia de retención placentaria.

otros

Prolapso uterino, Vaca de pie, Re prolapso y Amputación esto están relacionados la cual se pueden evitar su Tratamientos seria intervención quirúrgico aplicación de Antibióticos o bolos de oxitócina en el animal para su Tratamiento.

**Toxicosis
Gravídicas
Puerperales**

Los colapsos o colapso y de las paresias puerperales, e indicar cuales Son las principales enfermedades que pueden afectar al bovino en él Puerperio y con que pueden confundirse.

Hipocalcemia comatosa; cae en el parto y posterior mente entra en Depresión esto ocurre por la falta de calcio en el animal también Es Importante recordar que la cantidad de Ca que puede ser suministrado no es muy elevada frente a la necesidad del organismo.

Hipocalcemia forma tetánica; diferencia del caso anterior, el animal se encuentra en situación tetánica, con paresias y dificultad grave de

Locomoción tratamiento es sales de magnesio más recomendadas y cual Es el límite máximo a administrar.

Vaca caída en estado de alerta; diagnostico está caracterizado por Sensorio en vigilia, parálisis completa o incompleta de los miembros Posteriores el tratamiento Aplicar un suero de 400 ml agregando en él

100 ml de Fósforo 15-30 Bovinos

Gestosis

Esto es la enfermedad de la fase tardía del gestación en la que la hipertensión se Asocia a alteración hepática, neurológica, hematológica o renal, el desarrollo De edema

Síntomas de afectación neurológica y las convulsiones indican la presencia de Eclampsia. En la preeclampsia, se reduce la síntesis de PGI₂, y aumenta la Sensibilidad a la angiotensina II, y puede perderse el equilibrio que Normalmente existe entre los efectos agregarte plaquetario y vasoconstrictor del tromboxano A₂ y los efectos.

Tratamiento: se diagnostica la preeclampsia, el tratamiento Definitivo de la preeclampsia y de la eclampsia es el parto, que debe hacerse lo Antes posible si el tamaño y madurez del feto son adecuados.

Infecciones Puerperales

Durante el puerperio temprano se encuentran múltiples poblaciones Bacterianas en el útero. Su número se incrementa por algunos días y Decrece luego a medida que la involución uterina avanza.

Metritis puerperal; infección uterina, típicamente causada por bacterias Ascendentes desde el aparato genital inferior o el tracto urogenital. Los Síntomas son dolor uterino espontáneo, dolor pelviano o abdominal, fiebre, Malestar general y, a veces, flujo. El tratamiento sería con el uso de Antibióticos de amplio espectro, como las tetraciclinas o el cloranfenicol.

Endometritis, una infección del útero. Puede deberse a clamidia, gonorrea, tuberculosis o a una combinación de bacterias vaginales normales. **Es** más Probable que se presente después de un aborto espontáneo o de un parto. También **es** más común después de un trabajo de parto prolongado o de Una cesárea. Tratamiento uso de prostaglandinas cada 14 días desde los 30 días posparto, el uso de antibióticos no irritantes es lo ideal

Metritis y Piometra; estas dos son casi similares son dos infecciones Inflamación e infección del miometrio y la endometritis y por acción del Quiste luteinizado se cierra el cérvix, infección Acumulándose hasta 20 o 30 lts de exudado purulento tratar con antibióticos o intervención quirúrgica.