


TITULO: Mapa conceptual



- 
- Materia: Fundamentos de fauna silvestre
 - Docente: Gumeta Moreno Sarain
 - Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia
 - Cuatrimestre 8°
 - Nombre del alumno: Jimenez Fulgencio Lucero

Principales patológicas de fauna silvestre y técnicas quirúrgicas especiales

Enfermedades de los anfibios y los reptiles

EI

Frecuente es en vías respiratorias altas y bajas

De

Tipo bacteriano, viral, parasitario o micótico

Bacterianas

Parasitarias

Tortugas

Ofidios

Serpientes
ectoparásito acaro

Lagarto

Tortugas

Sx

Sx

Sx

Signos

Signos

-Secreción nasal
-Rinitis
-Sinusitis
-Disnea
-Sonidos anormales
-Natación dispareja
-Consolidación pulmonar debido a la fibrosis
-Neoplasia
-Inflamación

Disnea
Frecuencia respiratoria aumentada
Extensión del cuello
Descarga nasal
Depresión
Letargia.

Emaciación
Falta de apetito
Piel hiperémica y edematosa
Los animales se frotran con objetos largo tiempo en el recipiente del agua
Anemia
Formación de abscesos

Anemia
Dermatitis
Necrosis
Abscesos subcutáneos

Dermatitis
Necrosis
Abscesos subcutáneos

Tx

Tx

Tx

Tratamiento

Tratamiento

Antibacterianos
Ceftiofur 2.2 mg/kg IM cada 48 horas
Ciprofloxacina 10 mg/kg im cada 48 horas
Enrofloxacina 5-10 mg/kg im, sc, cada 24 h
Gentamicina 2.5 mg/kg im cada 72 horas
Oxitetraciclina 6-10 mg/k im cada 24 h

Se extraen con una pinza mosquito.
Ivermectina 0.2 mg/kg vía oral, sc, im

Remoción manual
Aplicar piretroides

Remoción manual
fipronil®, aplicar tópico con una gasa
Aplicar piretroides con una gasa y dejarla por 15 minutos
NO aplicar ivermectina



Principales patológicas de fauna silvestre y técnicas quirúrgicas especiales

Enfermedades de las aves

Parasitarias

Síndrome de mutilación o picaje

Es la

Costumbre de arrancarse las plumas, dejando áreas de piel completamente desnudas

Causas

Son

Virales, micóticas, microbianas, desórdenes endocrinos o nutricionales, por parásitos, alergias, por factores medioambientales o conductuales

Trichomona gallinae

Signos

Pérdida del apetito
Enflaquecimiento
Dificultad respiratoria
Presencia de líquido maloliente en cavidad bucal
Fluido grisáceo
Nódulos caseosos blanco amarillentos

Tratamiento

Metronidazol 10-30 mg/kg vo,
administrar por 6-7

Áscaris

Signos

Diarreas
Plumaje erizado
Mucosas pálidas
Estreñimiento
Muerte a los 8 días

Diagnostico

Detección de huevos
método de flotación

Eimeria spp

Signos

Pluma erizada
Mucosas pálidas
Inapetencia
Pérdida de peso
Diarrea sanguinolenta

Diagnostico

Identificación microscópica de los ooquistes en las heces