

**: ALUMNA: BRICEIDI PEREZ PEREZ**

**PROFESOR: ALFONSO VELAZQUEZ**

**MATERIA: MEDICO QUIRURGICO**

**TRABAJO: MAPA CONCEPTUAL**

**GRADO: 5TO CUATRIMESTRE**

**GRUPO: "C" SEMIESCOLARIZADO**

**LUGAR Y FECHA: FRONTERA COMALAP CHIAPAS, A 14-02-  
21**

Es un procedimiento para canalizar una vía venosa ya sea para administración de líquidos, medicamentos, o con fines diagnósticos a través de una vena.

ES

SIRVE PARA

Administrar nutrientes, suero, sangre, o electrolitos por vía intravenosa

# VENOCLISIS

SUS MATERIALES

- \*Abbotat o jeringa de 5 o 10 ml
- \*torunda o gasa empapada de antiséptico (alcohol)
- \*liga de goma o torniquete
- \*solución para administrar
- \*sistema de infusión o tubo extensor
- \* Cinta adhesiva de uso medico o cinta micropore de 10 cm.
- \* Guantes y mascarillas estériles y desechables
- \*bolsa para desechos

SU PROCEDIMIENTO

- 1- Explicar el procedimiento a realizar al paciente.
- 2- Conectar el sistema de infusión con la solución que se va a administrar (suero por ejemplo).
- 3- Purgar el sistema de infusión: Al conectar la solución que generalmente viene en frasco o bolsa dejar que el líquido circule por el sistema para que salga todo el aire y no queden burbujas.
- 4- Extraer el abbotat, jeringa o cánula de su empaqué y conectar en el extremo que corresponde al sistema de infusión extrayendo el aire al permitir que circule la solución.
- 5- Elegir la vena que va hacer canalizada de preferencia buscar un vaso sanguíneo en el dorso de la mano o antebrazo.
- 6- Ligar con un lazo de goma elástica aproximadamente 10 centímetros arriba del sitio que será punzado.
- 7- Limpiar bien con alcohol el área donde se hará la punción , dejando el área completamente aséptica
- 8- Con una mano la menos hábil sujeta la vena y con la otra cánula.
- 9- Introducir lentamente la aguja con una inclinación de aproximadamente 30 grados e ir disminuyendo el Angulo de inserción progresivamente.
- 10- Si se consiguió introducir la cánula exitosamente entonces se conectara la cánula al equipo de infusión.
- 11- Retirar la liga de coma o torniquete para posteriormente fijar el abbotat, aguja para venocliis, cánula o via intermitente con cinta medica.