Nombre del alumno: Yoli Melina Escobedo Montejo

Nombre del profesor: Dra. Martha Patricia Marín López

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Materia: Patología del niño y el adolescente

Grado: 5to.

Grupo: C

Frontera Comalapa, Chiapas a 08 de marzo de 2021.

BRONCONEUMONÍAS

Es una inflamación de la parte baja de las vías respiratorias debido a una infección causada por virus o bacterias.

Agente causal

Los más frecuentes son:

- Estreptococos
- Neumococo
- Haemophilus influenzae
- Pseudomonas aeruginosa
- Virus de la gripe

Transmisión

Puede ser de persona a persona, por gotas de saliva, secreción y por manos sucias.

Signos y síntomas

- Fiebre.
- Frecuencia respiratoria agitada, sobre las 40 o 60 respiraciones por minuto.
- Hundimiento o retracción de las costillas al respirar.
- Aleteo rápido de las fosas nasales al respirar.
- Escalofríos.
- Taquicardia.
- Estertores respiratorios.
- Respiración bronquial.
- Tos con esputo purulento y sanguinolento.
- Dolor torácico.
- Distención abdominal.

Cuidados en el pacientes

- Control periódico de salud.
- Fomento de la lactancia materna hasta por lo menos los 6 meses de edad.
- Prevención de la desnutrición y disminución de la contaminación ambiental y domiciliaria.
- Administración de medicamentos.
- Aplicación del plan de vacunación.

NEUMONÍA

Inflamación de los sacos aéreos de uno o ambos pulmones llenando los sacos de líquido o pus.

Agente causal

- Streptococcus pneumoniae.
- Mycoplasma pneumoniae.
- Chlamydia pneumoniae.

Transmisión

- Por vía aérea al toser o estornudar.
- Por la sangre al momento del parto.

Signos y síntomas

- Fiebre mayor de 38.5°C.
- Tos.
- Taquipnea.
- Rinorrea.
- Dolor en el pecho al respirar o toser.
- Dificultad respiratoria.
- Hiporexia.
- Estertores bronquiales.

Cuidados en el paciente

- Auscultación de los pulmones para descartar o detectar la presencia de secreciones.
- Colocar al paciente en una posición adecuada para ayudar a movilizar las secreciones.
- Administración de medicamentos.
- Monitorización de signos vitales.
- Evitar exposición al humo de tabaco.
- Aplicación del esquema de vacunación antineumococo a los 2, 4 y 12 meses, pentavalente e influenza.

BRONQUIOLITIS

Inflamación y obturación de los bronquiolos, afecta a niños de hasta dos años principalmente a bebes.

Agente causal

El virus respiratorio sincicial (VRS)

Transmisión

El virus se puede transmitir a través del contacto, es decir, cuando alguien infectado estornuda y tiene contacto con el niño a través de su respiración, puede ingresar al cuerpo a través de la boca o los ojos.

Signos y síntomas

- Silbidos al respirar.
- Aleteo nasal.
- Respiración rápida y superficial.
- Fatiga.
- Retracción de los músculos intercostales por esfuerzo para inhalar aire.
- Dificultades en la alimentación.
- Piel azulada.
- Tos.
- Fiebre.

Cuidados en el paciente

- Administración de medicamentos.
- Prevenir la exposición al humo o tabaco.
- Aspiración de secreciones.
- Administración de oxígeno.
- Monitorizar signos vitales.