NOMBRE DEL ALUMNO:

MELIDA YADIRA VELAZQUEZ GONZALEZ

NOMBRE DELPROFESOR:

Mtro. ERVIN SILVESTRE CASTILLO.

LICENCIATURA:

EN ENFERMERÍA

GRADO: 5° CUATRIMESTRE **GRUPO:** B

MATERIA:

ENFERMERIA CLINICA II

Nombre del trabajo:

"ALTERACIONES DE LA PLEURA, ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA"

Frontera Comalapa, Chiapas a 14 de febrero del 2021.

ALTERACIONES DE LA PLAURA, ACTUACION DE ENFERMARIA

- **Infecciones pulmonares**
  - Particularmente (NAC), han sido objeto de estudio e investigación desde la antigüedad
    - Aun no se conoce con exactitud la fisiopatología de esta
      - La función principal del pulmón es efectuar el intercambio de gases con la atmósfera
        - Cuando se respira por la nariz, las vibrisas nasales son capaces de eliminar partículas mayores de 10-15 µm
- **Insuficiencia respiratoria. (sdra)**
  - Es la incapacidad del aparato respiratorio para mantener un adecuado intercambio
    - De gaseoso necesario para atender las necesidades metabólicas del organismo
      - Podemos sospechar la existencia de una IRA por la presencia de síntomas y signos de hipoxemia y/o hipercapnia
- **Tromboembolismo pulmonar (TEP)**
  - Es la obstrucción del tronco de la arteria pulmonar o algunas de sus ramas
    - La TVP se encuentra en el 70% de los pacientes que han tenido TEP, a la inversa la TEP ocurre en cerca del 50% de los pacientes
      - Con TVP proximal de las extremidades inferiores
        - Factores de riesgo tales como el tromboembolismo venoso previo, cirugía reciente
- **Cáncer pulmón**
  - Una de las principales causas de muerte en el mundo
    - una vez realizado el diagnóstico
      - Los métodos de imagen continúan siendo una herramienta indispensable
        - Este fue considerado hasta mediados del siglo pasado como una enfermedad poco frecuente
          - Los factores de riesgo para el CP son diversos, pero destacan el tabaquismo
- **Traumatismos torácicos**
  - Son causa importante de morbilidad y mortalidad
    - siendo directamente responsables del 20-25% de las muertes
      - Debidas a traumatismos y contribuyen en el fallecimiento de otro 25%
        - La causa más frecuente de TT la constituyen, en el mundo occidental
          - Generalmente los TT se dividen en abiertos y cerrados, atendiendo a que exista o no una solución de continuidad en la pared torácica