



**NOMBRE DE LA ALUMNA:**

**YAQUELIN MONSERRAT LÓPEZ PÉREZ**

**NOMBRE DEL PROFESOR:**


**LIC. RUBEN EDUARDO DOMINGUEZ GARCIA**

**MATERIA: ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICO I**

**GRADO: 5º GRUPO: "B"**


FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS A 26 DE MARZO DEL 2021

**ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO  
HIDROELECTROLÍTICO Y ÁCIDO BASE**



# CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON QUIMIOTERAPIA.

Los cuidados de enfermería que estos pacientes precisan, van siempre relacionados con los efectos secundarios originados por el tratamiento



APARATO DIGESTIVO  
PROBLEMA POTENCIAL:  
nauseas

CUIDADO DE ENFERMERIA:  
Informar de su aparición, suele ser a las 2-3 horas de la administración de la quimioterapia y pueden durar hasta 72 horas. Disminuir la ansiedad.

PROBLEMAS POTENCIALES:  
esofagitis

CUIDADOS DE ENFERMERIA: Se pueden mitigar comiendo purés blandos, tomando líquidos abundantes y evitando especias, tabaco y alcohol.

PROBLEMA POTENCIAL:  
vómitos

Pueden ser agudos (primeras 24 horas, siendo muy intensos), anticipatorios (antes de la quimioterapia) y retardados (aparecen después de las primeras 24 horas, alcanzando un máximo entre las 48-72 horas y desaparecen al 4º o 5º día, son menos intensos, pero molestos por su duración).

PROBLEMA POTENCIAL:  
alopeciay disfagiay

CUIDADOS DE ENFERMERIA: Se trata de un efecto frecuente que varía en función del tipo de tratamiento quimioterápico utilizado

PROBLEMA POTENCIAL:  
estreñimiento

CUIDADOS DE ENFERMERIA: f Suele aparecer entre los 5-8 días siguientes al tratamiento. Algunos citostaticos pueden causar estreñimiento, causando un trastorno de la motilidad intestinal.

PROBLEMAS POTENCIALES:  
dermatitis,  
rash cutáneo e hiperpigmentación  
estomatitis

Usar talquistina para calmar el prurito y evitar la exposición al sol (fotosensibilidad).  
estomatitis

PROBLEMA POTENCIAL:  
diarrea

CUIDADOS DE ENFERMERIA:  
Se considera diarrea como consecuencia del tratamiento con citostaticos cuando hay 3 o más evacuaciones líquidas en las 24 horas siguientes a la administración de la quimioterapia con dolor cólico y distensión abdominal.

PROBLEMA POTENCIAL:  
trombocitopenia

CUIDADOS DE ENFERMERIA: La depresión máxima del estado plaquetario se produce aproximadamente entre los 7-14 días de iniciado el tratamiento.

PROBLEMAS POTENCIALES:  
mucositis

CUIDADOS DE ENFERMERIA: Se deberá informar al paciente sobre los distintos efectos de la quimioterapia sobre el tracto gastrointestinal y la boca. Aparece a los 7-14 días de la administración de citostaticos y puede permanecer durante 2-3 semanas.