

"MATERIA". MODULO 1

NOMBRE DEL DOCENTE. BEATRIZ GORDILO

PRESENTA: SUPERNOTA

ALUMNO: LOPEZ JIMENEZ CITLALI.

SEXTO SEMESTRE

BACHILLERATO

ESCOLARISADO

Síndrome de inmovilidad en el Adulto mayor.

CONCEPTO

El síndrome de inmovilidad se define como el descenso de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras



CLASIFICACION

Es una condición neurológica que afecta al cerebro y al sistema nervioso. La condición se convierte en niñez y es caracterizada normalmente por los movimientos involuntarios y las elocuciones llamados los tiques.

CAUSAS

Causas de inmovilidad en el adulto mayor son la falta de fuerza o debilidad, la rigidez, el dolor, alteraciones del equilibrio, reposo prolongado en cama, caídas, fractura de cadera y problemas psicológicos, entre otros.



CONSECUENCIAS

Puede conducir a caídas, incontinencia, pérdida de fuerza y capacidad aeróbica, alteraciones metabólicas (disminución de glucosa, balance negativo de calcio y nitrógeno), úlceras por decúbito, contracturas y trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.



MANEJO DE INMOVILISMO

Si la inmovilidad es total deben realizarse cambios posturales pasivos, como mínimo cada dos horas, asegurando que la postura sea correcta para evitar espasticidad, contracturas o posturas viciosas (especialmente importante tras un accidente cerebrovascular o ictus)



CUIDADOS DE ENFERMERIA

Escala de depresión geriátrica Para evaluar la capacidad social del anciano son útiles Escala de Recursos Sociales Es muy recomendable incorporar a la valoración de enfermería del adulto mayor, las líneas generales de la valoración geriátrica: fisiológica, psicológica, social y funcional.

