

Enfermedades Por estafilococos

Impétigo

Impétigo

Impétigo

Ectima

Complicaciones, síntomas o signos

Tratamiento. Se divide en 3 aspectos: medidas generales, tratamiento tópico, tratamiento sistémico.

Medidas generales. Se basa en la higiene y el aspecto nutricional, el aseo con agua y jabón son indispensables, recorte de uñas.

Tratamiento tópico. Va desde la eliminación de costras con compresas húmedas o clorhexidina y el uso del sulfato de cobre al 1% X 1000 o el permanganato de potasio, al 1% por 10,000.

Tratamiento sistémico. Ofrece curación más rápida y evita la enfermedad supurada y profunda.

Frecuente. Ocurre principalmente en niños, adolescentes y ancianos, afecta ambos sexos por igual.

manifestaciones clínicas. Pueden iniciarse con una vesícula o postula que evoluciona a la formación de una úlcera superficial.

Sistémico. Antibióticos sistémicos activos frente a S. pyogenes, Dicloxacilina - oxacilina, cefaloperinas de primera y segunda generaciones, macrólidos.

Tratamiento. desprendimiento de las costras, aplicación de compresas tibias, para ayudar a remover las costras, dos a tres veces al día

Enfermedades Por estafilococos

Complicaciones, Signos y Tratamientos

Frecuente. afecta a ambos sexos por igual y a todas las edades, más frecuentes en niños, en miembros inferiores (85%) y la cara, aunque otras áreas pueden ser afectadas.

Cuadro clínico. Inicia con un eritema mal definido, dolor circunscrito, aumento de volumen y calor local en el sitio afectado.

Complicaciones consiste en abscesos subcutáneos, osteomielitis, artritis séptica, tromboflebitis, bacteremia y fístulas necrotizante.

Tratamiento. es empírico en función de la identificación del microorganismo causal.

Diagnóstico diferencial debe realizarse con el impetigo buloso estafilococo, el herpes simple y las ampollas por fúnción.

Tratamiento.

Se recomienda incisión y drenaje + administración de Penicilina oral o intramuscular u otra terapia antibacteriana apropiada.

En pacientes alérgicos a beta lactámicos se puede emplear eritromicina o clindamicina.

Celulitis

Dactilitis Ampollosa

Enfermedades por estafilococos

Complicaciones, Síntomas, Signos y Tratamiento Clínico

Enfermedad estafilococica Perianal

Los niños con dermatitis perianal pueden presentar dolor rectal como una sensación de quemazón en el interior del ano al defecar y en ocasiones se evacúan heces con estrías de sangre. No se presentan síntomas generales.

Diagnóstico clínico debe confirmarse mediante cultivo del exudado anal, el diagnóstico diferencial debe realizarse con la psoriasis, dermatitis seborreica, candidiasis, oxirrosis, el abuso sexual y la enfermedad inflamatoria intestinal.

Tratamiento. debe ser perianal oral o macrolidos, durante 10 días. La muciplocina tópica es útil para evitar las recidivas.

Se manifiesta como una fronda lineal, eritematosa, con edematosa, caliente y dolorosa, que se correponde con el trayecto de los vasos linfáticos afectados.

Incluye fiebre, astenia y vefelias.
Diagnóstico diferencial. Se realiza con la tromboflebitis, que también se presenta como un cordón eritematoso y doloroso en una extremidad.

Tratamiento. es similar a la erisipela. Si los pacientes se presentan con toxicidad sistémica deben recibir tratamiento antibiótico por vía parenteral.

Linfangitis

Enfermedades por estafilococos complicaciones, Síntomas, Signos y Tratamiento clínico

Foliculitis

Diagnóstico clínico
La clave es la observación de una pustula con un pelo que sale del mismo centro de las lesiones.
Diagnóstico diferencial. Se realiza con el que presencia de comedones y ausencia de pelo que sale de las pustulas, con la foliculitis por gramnegativos.

Tratamiento

- medidas generales
- suprimir la causa
 - evitar la maceración y oclusión
 - curar las dermatosis existentes: eczemas, escabiosis, limpieza de la piel

Tratamiento tópico

- lavado de la zona afectada
- limpieza con antisepticos tópicos
- empleo de antibióticos tópicos: mupirocina, ácido fusídico, bacitracina/neomicina, gentamicina.