



Nombre del alumno: Rudy Ángel
Osvaldo Vázquez Zamorano

Nombre del profesor:

QFB Gladys Elena Gordillo Aguilar

Nombre del trabajo: “Tratamiento de la
sífilis”

Materia: “Microbiología Y
Parasitología”

Grado: 2er. Semestre.

Grupo: “A”

"Estudios de laboratorio" Sifilis

• VDRL.

Es obligada ante sospecha de sifilis en títulos $> 1:8$ es altamente sensible pero poco específica, se debe realizar la prueba antes de inicio de tratamiento.

• Pruebas con FTA-ABS.

Son altamente específicas y confirman el diagnóstico ya sustentado por el VDRL positivo.

"Tratamiento farmacológico"

Sifilis primaria:

- Penicilina G Benzatínica 2.4 millones de UI IM en dosis única.
- Doxiciclina 100 mg VO cada 12 horas por 14 días, es el antibiótico recomendado en pacientes alérgicos a la penicilina.
- Para pacientes alérgicos a la penicilina que no toleren vía oral o la doxiciclina es la Ceftriaxona 1g IV o IM diario por 10 días.

"Seguimiento y Vigilancia"

• Sifilis primaria.

En el retratamiento de esta enfermedad se recomienda

Penicilina G benzatínica 2.4 millones
de UI IM cada semana por 3 semanas,
la falla a tratamiento se considera
cuando no hay disminución de la titulación
en 4 veces la basal después de 6 meses
de iniciado el tratamiento, en este
caso se recomienda referir al 2º Nivel
para dar nuevo esquema con un
antibiótico de diferente familia.

BIBLIOGRAFIA

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/094_GPC_ETSadolescyadulto/ENF_SEXUALES_RR_CENETEC.pdf