



Nombre del alumno: Litzy Moreno Rojas

**Nombre del profesor: Gladys Elena
Gordillo Aguilar**

**Nombre del trabajo: Tratamiento
farmacológico de la Sífilis**

Materia: Microbiología y Parasitología

Grado: 2° A

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE SIFILIS

Penicilina G

Si no hay hipersensibilidad a la Penicilina G se puede utilizar:

SIFILIS TEMPRANA

Eritromicina

V.O. 500 mg cada 6 hrs (2 gr/día) durante 21 días

Tetraciclina

V.O. 500 mg cada 6 hrs (2 gr/día) durante 21 días

Penicilina benzotínica

Ampolleta por V.I. cada semana por 3 semanas (Sifilis precoz)

SIFILIS TARDÍA

Penicilina G Benzotínica

6 Ampolletas de UI cada una V.I.M., 1 cada 7 días

Penicilina G Sódica

UI por goteo I.V. durante 10 días con paciente internado

Embarazo

Hasta el 7mo mes, se administra Penicilina G Benzatínica, después del 7mo mes se utiliza Penicilina G sódica

Sifilis Congénita
Precoz

Penicilina G sódica

Sifilis Congénita
tardía

Penicilina G Benzatínica.

