



Nombre del alumno: Jhoana Guadalupe Arreola Mayorga

Nombre del profesor: Gladys Elena Gordillo Aguilar


Nombre del trabajo: Algoritmo de tratamiento para sífilis

Materia: Microbiología y parasitología

Grado: 2do semestre Medicina Humana

Algoritmo de tratamiento de sífilis

Jhoana Arreola



Tratamiento (sífilis):

	Principales	Esquemas alternativos
Sífilis temprana	<ul style="list-style-type: none"> - Penicilina benzatínica G 2.4 MUI IM dosis única. - Penicilina procaínica G 600 000 UI IM por 10 días. 	<ul style="list-style-type: none"> - Doxiciclina 100 mg VO por 14 días III, B - Azitromicina 2g VO (1b, B) o Azitromicina 500 mg al día 10 días (II, B). - Eritromicina 500 mg VO por 14 días - Ceftriaxona 500 mg IM diario por 10 días - Amoxicilina 500 mg VO + Probenecid 500 mg por 14 días III, B
Sífilis latente tardía, gomosa y sífilis cardiovascular	<ul style="list-style-type: none"> - Penicilina benzatínica 2,4 MUI IM semanal por dos semanas. - Penicilina procaína 600.000 unidades IM dosis única por 17 días 	<ul style="list-style-type: none"> - Doxiciclina 100 mg VO por 28 días. - Amoxicilina 2g VO + Probenecid 500 mg por 28 días.
Sífilis temprana en el embarazo	<ul style="list-style-type: none"> - Penicilina G benzatínica 2,4 MUI IM dosis única. - Penicilina G procaínica 600.000 unidades IM. diario 10 días (III, B). 	<ul style="list-style-type: none"> - Amoxicilina 500 mg VO + Probenecid 500 mg VO 14 días - Ceftriaxona 500 mg IM a diario 10 días (III, B) - Eritromicina 500 mg VO 14 días o Azitromicina 500 mg PO diario más evaluación
Sífilis congénita	<ul style="list-style-type: none"> - Benzilpenicilina sódica 100.000 - 150.000 unidades/kg al día IV (divididas en dosis de 50 000 unidades/kg 12 horas en los primeros 7 días de vida y 8 horas después) 10 días - Penicilina procaína 50.000 unidades/kg día IM 10 días. 	
Neurosífilis	<ul style="list-style-type: none"> - Penicilina procaínica 1.8-2.4 MUI IM + Probenecid 500 mg por 17 días - Benzilpenicilina 18-24 MUI diario 	<ul style="list-style-type: none"> - Doxiciclina 200 mg VO 28 días - Amoxicilina 2g VO. + Probenecid 500 mg VO 28 días - Ceftriaxona 2g IM (con lidocaína como diluyente) o IV (con agua como diluyente) 14 días

Referencias

Enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que producen úlceras genitales: herpes, sífilis, chancroide, linfogranuloma veré el y granuló a inguinal. Guía de evidencias y recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México, SEDENA; 2009