



Nombre del alumno:

Johana Nazareth Vázquez Flores

Nombre del profesor:

Q.C. Gladys Elena Gordillo Aguilar

Nombre del trabajo:

Tratamiento Sífilis

Materia:

Microbiología y parasitología

Grado:

2do A

Comitán de Domínguez, Chiapas a 10 de Mayo 2021

Tratamiento

Sífilis en incubación

Penicilina benzatínica G 2.4 MU
IM dosis única (fármaco de elección)
Doxiciclina 100 mg VO por 14 días
Azitromicina 1g VO

Sífilis congénita

Benzilpenicilina sódica 100 000
150 000 unidades / kg al día
IV (divididas en dosis de 50 mil
unidades / kg 12 hrs en las primeras
7 días de vida & 8 hrs después)
10 días
Penicilina procaína 50 000
unidades / kg al día IM 10 días

Sífilis temprana

Penicilina benzatínica G 2.4
MU IM dosis única
Penicilina procaína G
600 000 UI IM por 10 días

- Esquemas alternativos -

Doxiciclina 100 mg VO 14 días
Azitromicina 2g VO o 500 mg al
día por 10 días
Eritromicina 500 mg IM diario
por 10 días (si no hay alergia
a penicilina)
Amoxicilina 500 mg VO + Probenecid
500 mg por 14 días

Sífilis latente, gomas & cardiovascular

Penicilina benzatínica 2.4 MU
IM semanal por 2 semanas
Penicilina procaína 600 000
unidades IM dosis única por
17 días

- Esquema alternativo -

Doxiciclina 100 mg VO por
28 días
Amoxicilina 2g VO + Probenecid
500 mg por 28 días

Neurosifilis c/afectación
nerológica & oftálmica

Penicilina procainica 1.2-2.4
MUI IN + Probenecid 500mg
por 17 días

Benzilpenicilina 18-24 MUI
diario

- Esquema alternativo -

Doxiciclina 200mg VO 28 días

Amoxicilina 2g VO + Probenecid
500 mg VO 28 días

Ceftriaxona 2g IN (con lidocaina
como diluyente) o IN (con agua
como diluyente) 14 días

Sifilis en embarazo

Penicilina G benzatina 2.4

MUI IN dosis única en el 1er
& 2do trimestre

En el 3er trimestre, una segunda
dosis de **benzatina penicilina G**
2.4 MUI IN debe darse después
de una semana

Penicilina G procainica 600 000
unidades IN diario 10 días

- Esquema alternativo -

Amoxicilina 500 mg VO + Probenecid
500 mg VO 14 días

Ceftriaxona 500 mg IN a diario
10 días

Eritromicina 500 mg VO 14 días

o **azitromicina** 500 mg PO diario
10 días más la evaluación & el tx
de IN en el parto con penicilina

Referencia bibliográfica

(s/f). Guía de referencia rápida, enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que producen úlceras genitales: herpes, sífilis, cancroide, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal [Fecha de consulta 06 de Mayo 2021]. Disponible en http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/094_GPC_ETSadolescopyadulto/ENF_SEXUALES_RR_CENETEC.pdf

(s/f). Guía de Práctica Clínica, Enfermedades de Transmisión Sexual en el Adolescente y Adulto que producen Úlceras Genitales: Herpes, Sífilis, Chancroide, Linfogranuloma venéreo y Granuloma inguinal [Fecha de consulta 06 de Mayo 2021]. Disponible en <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/094GER.pdf>