



**Nombre del alumno:**

Yessica Guzmán Sántiz

**Nombre del profesor:**

Gladys Elena Gordillo Aguilar

**Nombre del trabajo:**

**ALGORITMO: TRATAMIENTO PARA SIFILIS**

**Materia:**

Microbiología y parasitología

**Grado:**

2°A


Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de mayo de 2021

# Algoritmo: tratamiento SIFILIS



si


comenzar tratamiento específico para sifilis



si

NO

- Tratar con Penicilina G. Benzatínica: 2.4 MUI IM dosis única
- Penicilina procaína G, 600,000 UI IM por 10 días



si

Dar esquema alternativo

- Doxicilina 100 mg VO por 14 días (III, B)
- Azitromicina 2g VO o 500 mg al día 10 días (II, B)
- Eritromicina 500 mg VO por 14 días
- Ceftriaxona 500 mg IM diario por 10 días (si no tiene alergia a penicilina)
- Amoxicilina 500 mg VO

fase avanzada

- Latente tardía
- Sifilis latente de duración desconocida
- Sifilis terciaria

- Penicilina benzatínica 2.4 MUI IM semanal por dos semanas (tres dosis)
- Penicilina procaína 600,000 UI IM dosis única por 17 días




si

- Doxicilina 100 mg VO por 28 días
- Amoxicilina 2g VO + probenecid 500 mg por 28 d.
- Tetraciclina oral 500 mg, 4 veces al día por 4 semanas



- Comenzar tratamiento
- Penicilina G benzatina, 2,4 MU IM dosis única en el 1er y 2do trimestre
  - En el 3er trimestre, una 2da dosis debe darse después de una semana (día 8).

- Esquema alternativo
- Amoxicilina 500 mg IM diario 10 días
  - Ceftriaxona 500 mg IM diario 10 días
  - Eritromicina 500 mg VO 14 días o azitromicina 500 mg PO diario 10 días (+ evaluación y el tratamiento de RN en el parto con penicilina).



- Benilpenicilina sódica 100,000 - 150,000 unidades / Kg / día IV (divididas en dosis de 50,000 UI / Kg / 12 horas en los 1ros 7 días de vida y 8 hrs después) 10 días

## REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Murray, P. R., & Rosenthal, K. S. (2013). *Microbiología médica (7a edición) (+ StudentConsult en español) (7.a ed.)*. Elsevier. (Página 177).

Cherneskie, T. (s. f.). *Revisión y Actualización del Diagnóstico y Manejo de la Infección por Sífilis*. Recuperado de [https://www.nycptc.org/x/Syphillis\\_Spanish\\_Module\\_Online.pdf](https://www.nycptc.org/x/Syphillis_Spanish_Module_Online.pdf)

Instituto Mexicano del Seguro Social. (s. f.). *Enfermedades de Transmisión Sexual en el Adolescente y Adulto que producen Úlceras Genitales: Herpes, Sífilis, Chancroide, Linfogranuloma Venéreo y Granuloma Inguinal*. Recuperado de <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/094GRR.pdf>

Guía de Práctica Clínica. (2009). *Enfermedades de Transmisión Sexual en el Adolescente y Adulto que producen Úlceras Genitales: Herpes, Sífilis, Chancroide, Linfogranuloma Venéreo y Granuloma Inguinal*. Recuperado de [http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/094\\_GPC\\_ETSad\\_olescyadulto/ENF\\_SEXUALES\\_RR\\_CENETEC.pdf](http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/094_GPC_ETSad_olescyadulto/ENF_SEXUALES_RR_CENETEC.pdf)