



PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre del alumno: Jesús Eduardo
Gómez Figueroa**

**Nombre del profesor: Gladys Elena
Gordillo Aguilar**

**Nombre del trabajo: Tratamiento de
la sífilis**

**Materia: Microbiología y
parasitología**

Grado: 2 A

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de mayo del 2021



ESTUDIOS DE LABORATORIO.

● VDRL es obligada ante sospecha de sífilis en títulos $> 1:8$. Es altamente sensible pero poco específica, se debe realizar la prueba antes del inicio del tratamiento.

● PRUEBAS CON FTA-ABS son altamente específicas y confirman el diagnóstico ya sustentado por el VDRL positivo.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO.

Sífilis primaria: Penicilina G Benzatinica 2.4 millones de UI IM en dosis única, es el fármaco de elección. Doxiciclina 100 mg VO cada 12 h por 14 días, es el antibiótico recomendado en pacientes alérgicos a la penicilina. Una opción para pacientes alérgicos a la penicilina que no toieren vía oral o la doxiciclina es la ceftriaxona 1 g IV o IM diario por 10 días.

Sífilis temprana (primaria, secundaria y latente)

1. Penicilina benzatinica G. 2.4 MUI IM dosis única.
2. Penicilina procainica G 600 000 UI IM por 10 días.

Sífilis latente tardía, gomosa y sífilis cardiovascular.

1. Penicilina benzatinica 2,4 MUI IM semanal

por dos semanas (tres dosis)

2. Penicilina procainica 600.000 unidades IM
dosis única por 17 días.

Esquema alternativo de sífilis latente tardía,
sífilis cardiovascular y gomosa

1. Doxiciclina 100 mg VO por 28 días

2. Amoxiciclina 2g VO + Probenecid 500 mg por 28 días.

Sífilis temprana en el embarazo.

1. Penicilina G benzatina 2,4 mil IM dosis
única en el primer y segundo trimestre (II, B).
(cuando el tratamiento es la maternidad iniciada)

2. En el tercer trimestre, una segunda dosis
de benzatina penicilina G 2,4 mil IM debe
darse después de una semana (día 8).

3. Penicilina G procainica 600.000 unidades IM.
diario 10 días (III, B)

Esquemas alternativos

1. Amoxiciclina 500 mg VO + Probenecid 500 mg VO 14
días (III, B)

2. Ceftriaxona 500 mg IM a diario 10 días (III, B)

3. Eritromicina 500 mg VO 14 días o Azitromicina

500 mg PO diario 10 días más la evaluación

y el tratamiento de recién nacidos en el
parto con penicilina (III, B).

GOBIERNO FEDERAL, IMSS. (ISBN: 978-607-8270-26-2). Enfermedades de Transmisión Sexual en el Adolescente y Adulto que producen Úlceras Genitales: Herpes, Sífilis, Chancroide, Linfogranuloma venéreo y Granuloma inguinal. 14 DE MAYO DE 2021, de IMSS Sitio web: <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/094GER.pdf>