



**Nombre del alumno: Karla Bedolla  
Fernandez**

**Nombre del profesor: Gladis Elena  
Gordillo Aguilar**

**Nombre del trabajo: Algoritmo del  
tratamiento de la sífilis**

PASIÓN POR EDUCAR

**Materia: Microbiología y parasitología**

**Grado y Grupo: 2do "B"**

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de marzo del 2021

# " S i f i l i s "

(Infección por *Treponema pallidum*)

↓  
- Hombres y mujeres NO Gestantes -

Temprana

Primaria, Secundaria y latente temprana.

1° Chancro, linfadenopatía local o regional con periodo de incubación entre 10 a 90 días duración 2 a 8 s.

"Desaparece espontáneamente"

2° Roséola sífilítica y cutáneas y mucosas, Condiloma, alopecia, fiebre, hematogamelia / inicia de 6 s a 6 meses luego de la infección.

## • Tratamiento •

- Penicilina G Benzatínica 2.400.000 UI IM (Dosis Única)

→ Azitromicina 2g (única dosis)

Tardía

Terciario

3° Vasculitis, gomas sífilíticas en piel, hueso mucosas o otro tejido Inicia: 2 a 40 años del inicio de la infección

## • Tratamiento •

penicilina G Benzatínica 2.400.000 UI s/por 3 s.

Doxiciclina 100mg / 12 hrs / 21-28 días.

# Diagnostico Serologico...

PNT = (VDRL - USR - RPR)

Reactivo

PT (TP - PA / HA - TP / FTA  
abc / CIA)

Positiva

Confirma  
Sifilis

- Actual o Pasada -

Negativa

Falso Reactivo

(PNT)

No Reactivo

Descarta  
Sifilis.

Realizar PT, si sospecha 1º o sifilis latente, tardia o terciaria.

**Bibliografía:** ENF SEXUALES EVR CENETEC.doc. Guía de práctica clínica-  
[http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/094\\_GPC\\_ETSadolescyadulto/ENF\\_SEXUALES\\_EVR\\_CENETEC2.pdf](http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/094_GPC_ETSadolescyadulto/ENF_SEXUALES_EVR_CENETEC2.pdf)