

Nombre del Alumno: Brenda Nataly Galindo Villarreal

Nombre del Docente: Gladys Gordillo

Nombre del Trabajo: Tratamiento de la sífilis

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Microbiología y Parasitología

Carrera: Medicina Humana

Grado: 2do Semestre

Carrera: Medicina Humana

• TRATAMIENTO DE LA SIFILIS.

SIFILIS RECIENTE:
(Primaria, secundaria o latente, de menos de un año de evolución).

1. Penicilina G Benzatinica
Dosis T: 2,4 millones de U.
inyectadas por vía intramuscular
en una sola sesión

2. Penicilina G procaina
acuosa.
Dosis T: 4,8 millones de U, se
administran 600.000 U. dia-
rias por inyección im. x 8 días.

3. Penicilina G procaina en
aceite con 2% de mono-este-
rato de aluminio (PAM)
Dosis T: 4,8 millones de U. en
inyección im; 2,4 millones de
U. en la primera visita y 1,2
millones de unidades en cada
una de dos subsiguientes
visitas con intervalos de 3
días.

(es usada en otros países
pero EU es poco corriente).

• 19-MAY-2021.
(DATO)

La penicilina
continúa siendo
la droga de ele-
cción para tratar
cualquier estado
de sífilis.

PACIENTES CON
ALERGIA A LA
PENICILINA:

1) Clorhidrato de
tetraciclina: 500
mg. cuatro veces al
día, por vía oral,
durante 15 días.

2) Eritromicina,
500 mg, 4 veces
al día, por vía oral
durante 15 días.

SIFILIS TARDIA
(CON MÁS DE UN AÑO
DE EVOLUCIÓN).

1) Penicilina G
benzatinica.
Dosis T: 7,2 millones

U, 2,4 millones de u.
diarias, por inyección
im, durante cada semana
durante 3 semanas
consecutivas.

2. Penicilina G procaína
acuosa, dosis T: 4
millones de U, 600.000
Unidades diarias, por
inyección im, durante
15 días sucesivos.

SIFILIS OCULAR & NEUROSIFILIS

- Penicilina acuosa 3 04 m de u.
iv. cada 4 hrs.
- Penicilina G procaína 2,4 millo-
nes de u, por vía im. 1 día +
500 gramos de proteneid, 4
veces al día.

Bibliografía

EE.UU, R. D. (s.f.). ESQUEMA RECOMENDADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS. *Biomedicina* ,
4.