



**Nombre del alumno: Jhair Osmar
Roblero Díaz**

**Nombre del profesor: Gordillo Aguilar
Gladys Elena**

**Nombre del trabajo: cuadro
comparativo (infecciones cutáneas
bacterianas)**












Materia: microbiología y parasitología

Grado: segundo semestre

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de Marzo del 2021

Estafilococos

Bacteria	Enfermedades	piel	Signos y síntomas	Complicaciones	imagen
	Impétigo	en la cara alrededor de la nariz y la boca, el cuello, las manos	Una o más ampollas que están llenas de pus y son fáciles de reventar. Ampollas que causan comezón, están llenas de un líquido amarillo o color miel, que supuran y forman costras. Lesiones cutáneas en la cara, los labios, los brazos o las piernas que se propagan a otras zonas.	Complicación más frecuente es la celulitis. En casos graves pueden producirse meningitis o sepsis. Otras raras complicaciones pueden ser ectima, erisipela, osteomielitis, celulitis profunda, bacteriemia, artritis séptica, linfadenitis y neumonía.	
	Ectima	la piel similar al impétigo	clínicas pueden iniciarse con una vesícula o pústula que evoluciona a la formación de una úlcera superficial, con bordes levantados, indurados, color violáceo y granulación en la base	El desarrollo de bacteriemia y glomerulonefritis secundarias. Se presentan con mayor frecuencia en pacientes diabéticos e inmunocomprometidos	
	Foliculitis	Superficial afecta la parte superior del folículo capilar y la piel en contacto directo con el folículo. La foliculitis profunda afecta la parte más profunda del folículo y puede abarcar todo el folículo capilar	Grupos de pequeños bultos rojos o espinillas cabeciblancas que se forman alrededor de los folículos pilosos. Ampollas llenas de pus que se abren y forman costras. Picazón o ardor en la piel. Dolor o sensibilidad en la piel. Un gran bulto o protuberancia hinchados.	Reaparición o propagación de la infección. Forúnculos debajo de la piel (furunculosis) Daño permanente en la piel	
	Furúnculo, furunculosis	enrojecimiento o espinillas	Los forúnculos comienzan como protuberancias rojas y blandas. Se llenan de pus, crecen, se revientan y se drenan. Un carbunco es un grupo de forúnculos.	Es una infección del folículo pilosebáceo por bacilos gramnegativos, que suele surgir como complicación del tratamiento del acné con antibióticos durante períodos de tiempo prolongados.	
	Ántrax	ampolla, costra oscura, protuberancia pequeña o úlceras	Fiebre y escalofríos. Molestia en el pecho. Dificultad para respirar. Confusión o mareo. Tos. Náuseas, vómitos o dolor estomacal. Dolor de cabeza. Sudor (a menudo fuerte sudoración)	Absceso del cerebro, la piel, la médula espinal u órganos como los riñones. Endocarditis. Osteomielitis. Cicatrización permanente de la piel.	
	Foliculitis de la barba	descansa cada pelo, que puede ser de la barba, el cuero cabelludo o de otras zonas del cuerpo	Grupos de pequeños bultos rojos o espinillas cabeciblancas que se forman alrededor de los folículos pilosos. Ampollas llenas de pus que se abren y forman costras. Picazón o ardor en la piel. Dolor o sensibilidad en la piel. Un gran bulto o protuberancia hinchados	Reaparición o propagación de la infección. Forúnculos debajo de la piel (furunculosis) Daño permanente en la piel, como cicatrices o manchas oscuras. Destrucción de los folículos pilosos y pérdida permanente del cabello	
	Perioritis	Afecta dorso, muslos, nalgas	Dolor abdominal Sensibilidad en el tacto Hinchazón en el abdomen	Es una complicación de la miliaria rubra (Sudamina) provocada por Staphylococcus, que infecta las glándulas sudoríparas ecninas Se presenta en menores de 1 año Constituida por pústulas que se superponen a las vesículas de la miliaria rubra	
	Hidrosadenitis	bultos, erupciones, erupciones que parecen acné,	Esta afección se caracteriza por la aparición de protuberancias del tamaño de un guisante o una canica debajo de la piel, que pueden ser dolorosas y tienden a agrandarse y supurar	Infección. El área afectada es susceptible a la infección. Cicatrices y cambios en la piel.	
	Síndrome de la piel escaldada	Eritema (en el centro), ampollas (a la izquierda) y exfoliación de la piel (a la derecha).	Áreas rojas, dolorosas alrededor del sitio de la infección. Ampollas. Fiebre. Escalofríos. Debilidad. Pérdida de fluidos.	son secundarias a deshidratación o sobreinfección (celulitis, sepsis, fascitis necrosante)	
	Síndrome del shock tóxico	descamación o erupciones	Algunos de los síntomas son fiebre alta, baja presión arterial, vómitos y sarpullido	la neumonía. un absceso. una infección en la piel. una herida infectada. la infección de la sangre, septicemia. la infección de los huesos, osteomielitis	
	Escarlatina estafilocócica	las partes blandas incluyen, desde formas parte superficial de la piel (impétigo)	Dolor de garganta con enrojecimiento intenso. Fiebre Lengua (roja y con pequeños bultos). Sarpullido rojo que al tacto parece papel de lija.	celulitis y absceso periamigdalino, absceso retrofaríngeo, mastoiditis, adenitis cervical supurativa, meningitis, trombosis de senos venosos, absceso cerebral y focos metastásicos por diseminación hematogena	

Bibliografía

Leonardo Sánchez–Saldaña, E. S.-A. (20 de Enero de 2006). *EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA*. Obtenido de INFECCIONES CUTÁNEAS BACTERIANAS. Disponible: file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/INFECCIONES CUTANEAS.pdf